



ACTUALITATEA TEMEI

Referitor la frecvența fracturilor la copil, datele literaturii unanim consideră că cele mai frecvente sunt fracturile membrului superior (75-90%), iar fracturile de antebraț predomină circa 70% printre ele. Atitudinea neadecvată față de copiii cu fracturi de antebraț, poate fi cauza aparițiilor unor complicații grave.

SCOPUL

Efectuarea unui studiu complex cu referire la etiopatogenia, diagnosticul clinic și radiologic, tratamentul conservator ortopedic și chirurgical în fracturile diafizare ale ambelor oase ale antebrațului la copil.

MATERIALE ȘI METODE


Lucrarea de față este rezultatul unui studiu retrospectiv, efectuat pe pacienții internați și tratați în anul 2018-2019, în secția de Ortopedie și Traumatologie a Centrului Mamei și Copilului din Chișinău, cu diagnosticul de fractură de antebraț. Studiul a fost efectuat pe un lot de 78 pacienți, dintre care 45 sunt băieți (57,7%) și 33 – fete (43,3 %), cu prevalarea sexului masculin în raport de 2:1. Copii din mediul rural – 43, comparativ cu 35 pacienți mediul urban.

REZULTATE

TABELUL 1
REPARTIȚIA PACIENȚILOR PE GRUPE DE VÂRSTĂ

Grupe de vârstă	Nr. de cazuri	Procente
0-5 ani	12	15,4 %
6-10 ani	33	42,3 %
11-15 ani	23	29,5 %
16-18 ani	10	12,8 %
	78	100 %

Repartiția cazurilor în funcție de mediul de proveniență



CONCLUZII

Tratamentul ortopedic este rezervat fracturilor incomplete și în cazul fracturilor fără dislocare de la nivelul antebrațului. Tehnica de tratament chirurgical a fost aplicată fracturilor de antebraț complete, cu deplasare.

BIBLIOGRAFIE