

CLINICAL FEATURES OF PATIENTS, NEW CASES WITH PULMONARY TUBERCULOSIS IN CURRENT CONDITIONS

Topal Alexandra

Scientific adviser: Ustian Aurelia

Department of Phthisiopneumology, *Nicolae Testemitanu* SUMPh

Background. The clinical features of pulmonary tuberculosis play an important role in timely diagnosis and effective treatment. **Objective of the study.** The study of the clinical features of new cases with pulmonary tuberculosis and the effectiveness of treatment. **Material and Methods.** A retrospective, cohort study, which included 257 patients with pulmonary tuberculosis, a new case from 2017. The patients were divided into three groups: group I included 71 (27.6%) patients with negative microbiological results, group II - 119 (46.3%) patients with sensitive, positive results and group III - 67 (26.1%) patients with resistant, positive results. **Results.** Moderate intoxication syndrome predominated in group I-42 (59.2%), pronounced - group II - 60 (51.4%) and group III - 43 (64.2%). Moderate broncho-pulmonary syndrome predominated in group I - 40 (56.3%), pronounced - group II - 66 (55.5%) and group III - 58 (86.6%). In group I predominated: infiltrative tuberculosis - 64 (90.1%), limited location - 42 (59.2%), unilateral - 41 (57.7%), ESR 21-30 - 13 (18.3%), anemia - 11 (15.5%). In groups II and III predominated: infiltrative tuberculosis - 111 (93.3%) and 59 (88.1%), extended - 68 (57.1%) and 57 (85%), bilateral - 66 (55.5%) and 53 (79.1%), ESR 21-30 - 29 (24.4%) and ESR 31-40 at 23 (34.3%), anemia - 33 (27.7%) and 30 (44.7%). **Conclusion.** The most severe forms of tuberculosis, with more pronounced clinical and paraclinical manifestations are observed in patients with positive resistant microbiological results.

Keywords: tuberculosis, clinical features.

PARTICULARITĂȚILE CLINICE ALE PACIENȚILOR, CAZURI NOI CU TUBERCULOZA PULMONARĂ ÎN CONDIȚIILE ACTUALE

Topal Alexandra

Conducător științific: Ustian Aurelia

Catedra de pneumoftiziologie, USMF „Nicolae Testemitanu”

Introducere. Particularitățile clinice ale tuberculozei pulmonare au un rol important pentru un diagnostic la timp și un tratament eficient. **Scopul lucrării.** Studiarea particularităților clinice ale cazurilor noi cu tuberculoză pulmonară și ale eficacității tratamentului. **Material și Metode.** Studiu retrospectiv, de cohortă, care a inclus 257 de pacienți cu tuberculoză pulmonară, caz nou, din anul 2017. Pacienții au fost divizați: lot I a inclus 71 (27, 6%) bolnavi cu rezultate microbiologice negative, lot II - 119 (46,3%) bolnavi cu rezultate pozitive sensibile și lot III - 67 (26,1%) bolnavi cu rezultate pozitive rezistente. **Rezultate.** Sindromul de intoxicație moderat a predominat în lotul I- 42 (59, 2%), pronunțat - lotul II - 60 (51, 4%) și lotul III-43 (64, 2%). Sindromul bronho-pulmonar moderat a predominat în lotul I - 40 (56, 3%), pronunțat - lotul II - 66 (55, 5%) și lotul III - 58 (86, 6%). În lotul I a predominat: tuberculoza infiltrativă - 64 (90, 1%), localizarea limitată - 42 (59,2%), unilaterală - 41 (57,7%), VSH 21-30 - 13 (18,3%), anemia a fost la 11 (15,5%). În loturile II și III a predominat: tuberculoza infiltrativă - 111 (93,3%) și 59 (88,1%), extinsă - 68 (57,1%) și 57 (85%), bilaterală - 66 (55,5%) și 53 (79,1%), VSH 21-30 - 29 (24,4%) și VSH 31-40 la 23 (34,3%), anemia - 33 (27,7%) și 30 (44,7%). **Concluzii.** Cele mai severe forme de tuberculoză, cu manifestări clinice și paraclinice mai pronunțate sunt observate la pacienți cu rezultatele microbiologice pozitiv rezistente.

Cuvinte-cheie: tuberculoză, particularități clinice.