

THE IMPACT OF PSYCHO-SOCIAL FACTORS ON THE ADVERSE EFFECTS OF ANTIPSYCHOTICS IN PARANOID SCHIZOPHRENIA

Mironov Olga

Scientific adviser: Deliv Inga

Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology, *Nicolae Testemitanu* SUMPh

Background. Schizophrenia is a chronic, severe mental disorder that affects the way a person thinks, feels, and behaves. The disease can manifest itself through a combination of various symptoms: hallucinations, illusions, thoughts and disordered behavior. **Objective of the study.** Analysis and evaluation of psychosocial factors in the manifestation of adverse effects of therapy with antipsychotic remedies in patients with paranoid schizophrenia. **Material and Methods.** The study was conducted by literature review and clinical evaluation of 40 patients diagnosed with paranoid schizophrenia. The cases included in the study were performed randomly, gender equality - women, men. **Results.** When the patient with paranoid schizophrenia is in a society with negative emotional expression, the risk of recurrence is 2 times higher. About 1/3 of patients with paranoid schizophrenia take antipsychotic medication only to reduce family conflicts **Conclusion.** (1) About 2/3 of patients with paranoid schizophrenia abandon antipsychotic treatment due to stigmatization by society. (2) Psychosocial factors with positive impact improve the clinical and functional recovery of the patient, reduce the manifestation of adverse effects.

Keywords: schizophrenia, antipsychotics, side effects.

IMPACTUL FACTORILOR PSIHO-SOCIALI ASUPRA EFECTELOR ADVERSE ALE ANTIPSIHOTICELOR ÎN SCHIZOFRENIA PARANOIDĂ

Mironov Olga

Conducător științific: Deliv Inga

Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”

Introducere. Schizofrenia este o tulburare mentală cronică, severă care afectează modul în care o persoană gândește, simte și se comportă. Boala se poate manifesta printr-o combinație de diverse simptome: halucinații, iluzii, gânduri și comportament dezordonat. **Scopul lucrării.** Analiza și evaluarea factorilor psihosociali în manifestarea efectelor adverse ale terapiei cu remedii antipsihotice la pacienții cu schizofrenie paranoidă. **Material și Metode.** Studiul a fost realizat prin analiza bibliografică a literaturii de profil și evaluarea clinică a 40 pacienți diagnosticați cu schizofrenie paranoidă. Cazurile incluse în studiu au fost efectuate în mod aleatoriu, egalitate gender – femei, bărbați. **Rezultate.** Atunci când bolnavul cu schizofrenie paranoidă se află într-o societate cu exprimare emoțională negativă, riscul de recidivare e de 2 ori mai mare. Circa 1/3 pacienții cu schizofrenie paranoidă administrează medicația antipsihotică doar cu scopul de a reduce conflictele în familie. **Concluzii.** 1) Circa 2/3 dintre pacienții cu schizofrenie paranoidă abandonează tratamentul antipsihotic din cauza stigmatizării de către societate. (2) Factorii psihosociali cu impact pozitiv îmbunătățesc recuperarea clinică și funcțională a pacientului, reduc manifestarea efectelor adverse.

Cuvinte-cheie: schizofrenie, antipsihotice, reacții adverse.