

QUALITY OF LIFE CLINICAL RATING SCALES IN PATIENTS WITH PEPTIC ULCER DISEASE COMPLICATED WITH PERFORATION

Sor Elina

Nicolae Anestiadi Department of Surgery no. 1, *Nicolae Testemitanu* SUMPh

Background. Monitoring and enhancement of a patient's health-related quality of life is an important element of research and medical care. **Objective of the study.** To evaluate the therapeutic effects and quality of life in patients treated with different types of surgical treatment of perforated ulcer. **Material and Methods.** We used the validated questionnaires - GSRS and GIQLI. These scores represent specific instrument for gastrointestinal diseases, each rated on a seven-point Likert scale from which one represents no discomfort and seven represents very severe discomfort. **Results.** Postoperative overall health was significantly higher in group with laparoscopic treatment compared with preoperative level and comparable with general population. **Conclusion.** Minimally invasive introduction of technology has opened up a new direction for health related quality of life as comparative analysis between open and laparoscopic methods without evaluating the quality of life of the patient will be insufficient.

Keywords: quality of life , perforated ulcer.

SCORURILE CLINICE DE EVALUARE A CALITĂȚII VIEȚII LA PACIENȚII CU BOALA ULCEROASĂ COMPLICATĂ CU PERFORAȚIE

Șor Elina

Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, USMF „Nicolae Testemițanu”

Introducere. Monitorizarea și îmbunătățirea calității vieții legate de sănătatea pacientului reprezintă un element crucial al cercetării și al asistenței medicale. **Scopul lucrării.** Evaluarea eficacității tratamentului și a calității vieții la pacienții cu ulcer perforat după diferite metode de intervenții chirurgicale. **Material și Metode.** Am folosit chestionarele validate - GSRS și GIQLI. Aceste scoruri reprezintă un instrument specific pentru bolile gastro-intestinale, fiecare evaluată pe o scară Likert în șapte puncte, dintre care unul nu reprezintă disconfort și șapte reprezintă un disconfort foarte sever. **Rezultate.** Calitatea vieții postoperatorie a fost semnificativ mai mare în lotul pacienților supuși tratamentului laparoscopic comparativ cu nivelul preoperator și comparabilă cu populația generală. **Concluzii.** Introducerea tehnologiilor minim invazive a deschis o nouă direcție pentru calitatea vieții corelată cu sănătatea, deoarece analiza comparativă între metodele deschise și laparoscopice fără aprecierea calității vieții pacientului va fi insuficientă.

Cuvinte-cheie: calitatea vieții, ulcer perforat.