

CERCETĂRI PRIVIND ASISTENȚA FARMACEUTICĂ A BOLILOR PALIATIVE

Bogatu Nadejda

(Conducător științific: Scutari Corina, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică)

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Introducere. Studiile despre îngrijirea paliativă în R. Moldova și verigele principale care protejează organismul împotriva suferințelor cauzate de boli paliative prezintă interes major pentru practica medicală [1].

Scopul lucrării. Studiul manifestărilor clinice și a medicației bolilor paliative în perioada anilor 2015-2017.

Material și metode. Analiza a 97 cazuri de boli paliative efectuată la Fundația Filantropică Medico-Sociale „Angelus Moldova”.

Rezultate. În baza rezultatelor obținute s-a constatat, majoritatea cazurilor de boli paliative au fost cauzate de cancer de glandă mamară, cancer pulmonar și cancer al colului uterin. În jur de 70 la sută cazuri de adresare, boala a fost deja în stadiul III B sau chiar IV, când șansele de supraviețuire la 5 ani sunt minime sau chiar inexistente. Cele mai comune semne și simptome caracteristice bolii au fost osalgii violente (100%); artralgiile (26%); greață, vomă, constipații (84%), anorexie (83%), pierdere în greutate (48%), febră (25%), slăbiciune generală (76%). Tratamentul bolilor paliative a constat în administrarea analgezicelor opiacee (92%), glucocorticoizilor (82%), diureticelelor (34%), anxioliticelor (28%), hipnoticelor (22%), antidepressivelor (15%) și laxativelor (38%).

Concluzii. Îngrijirea paliativă este o abordare care îmbunătățește calitatea vieții pacienților prin identificarea precoce, evaluarea corectă și tratamentul adecvat.

Referințe bibliografice.

1. Lupsa R, Csiki C – Îngrijirea paliativă în practica medicală, Ed. Alutus, 2003, 266.

Cuvinte cheie. Boli paliative, dureri, tratament, analgezice

RESEARCHES CONCERNING PHARMACEUTICAL ASSISTANCE OF PALLIATIVE DISEASES

Bogatu Nadejda

(Scientific advisor: Scutari Corina, PhD, associate professor, Department of pharmacology and clinical pharmacy)

Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova

Introduction. The studies concerning the palliative care in the Republic of Moldova and the main branches that protect the organism against suffers caused by palliative diseases present major interest for medical practice [1].

The aim of the study. The study of clinical manifestations and medication of palliative diseases between 2015 and 2017.

Material and methods. Analysis of 97 cases of palliative diseases made at the Medical-Social Philanthropic Foundation „Angelus Moldova”.

Results. Based on the obtained results, we can conclude that the most of cases of palliative diseases were caused by breast cancer, lung cancer and cancer of the cervix. In about 70% of cases, the disease was at III B or even IV stage, when survival chances in 5 years are minimal or non-existent. The main signs and specific symptoms of the disease were violent bone pain recorded at all hospitalized patients (100%); arthralgia (26%), nausea, vomiting, constipation (84%), anorexia (83%), weight loss (48%), fever (25%), general weakness (76%). The treatment of palliative diseases consisted in administration of opioid analgesics (92%), glucocorticoids (82%), diuretics (34%), anxiolytics (28%), hypnotics (22%), antidepressants (15%) and laxatives (38%).

Conclusions. Palliative care is an approach that improves the quality of patient's life by early identification, correct evaluation and adequate treatment.

Bibliographical references.

1. Lupsa R, Csiki C – Palliative care in medical practice, Ed. Alutus, 2003, 266.

Keywords. Palliative diseases, pains, treatment, analgesics