

VASILE VALERIU LUPU, INGRITH MIRON, ANCUȚA LUPU

PROBLEME DE ADAPTARE ALE SUGARILOR NĂSCUȚI PRIN CEZARIANĂ

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Disciplina Pediatrie (Iasi, România)

Trecerea de la viața intrauterină la cea extrauterină este o adaptare fiziologică complexă. Cele mai frecvente probleme de adaptare sunt prezente la născuții prematuri și la cei la termen născuți prin operație cezariană. Operația cezariană efectuată la cererea mamei (în absența indicațiilor materne sau fetale) crește riscul de spitalizare prelungită, poate provoca probleme de respirație la copii și crește riscul de complicații într-o sarcină ulterioară. De asemenea, alăptarea este întârziată la copiii născuți prin cezariană. Beneficiile nașterii prin cezariană sunt pe termen scurt: mai puține complicații chirurgicale, risc scăzut de sângerare și absența incontinenței urinare. Există autori care susțin că nașterea prin cezariană efectuată la cererea mamei, precum și nașterea prin cezariană de urgență sunt asociate cu un risc ridicat de morbiditate atât pentru mamă cât și pentru făt.

Cuvinte-cheie: nou-născuți, operație cezariană, anomalii în adaptare

VASILE VALERIU LUPU, INGRITH MIRON, ANCUȚA LUPU

ADJUSTING PROBLEMS IN NEWBORNS DELIVERED BY CAESAREAN SECTION

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Pediatrics Department (Iasi, România)

The transition from intrauterine to extrauterine life is a complex physiological adaptation. The preterm and the term infants delivered by caesarean section have the most adjustment problems. Caesarean section performed at the request of the mother (in the absence of maternal or fetal indications) increase the risk of prolonged hospitalization, can cause breathing problems in children and increases the risk of complications in a subsequent pregnancy. Also, in children born by caesarean section breastfeeding is delayed. The benefits of birth by caesarean are for short term: fewer surgical complications, low risk of bleeding, and absence of urinary incontinence. Birth by caesarean section performed at the request of the mother, as well as emergency caesarean delivery is associated with a high morbidity risk to both mother and fetus according to some authors.

Key words: newborns, caesarean section, abnormalities in adaption