

## RISK FACTORS IN MULTIPLE SUICIDE ATTEMPTS

Mamedova Alina

Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology, *Nicolae Testemitanu* SUMPh

**Background.** Suicide is a serious public health problem. Suicide attempts are more common compared to completed suicides. There are, however, important predictors of repeated attempts. The aim of the paper was to evaluate the data on risk factors in multiple suicide attempts. **Objective of the study.** Evaluation of risk factors in multiple suicide attempts depending on age, gender and mental illness present. **Material and Methods.** The research was conducted within the Department of Psychiatry, Narcotics and Medical Psychology of USMF "Nicolae Testemitanu". The publications on multiple suicide attempts available on PubMed were studied. **Results.** The most common risk factors for subsequent suicide attempts are previous ones. Among other factors that find the average age, unemployment, divorce, abandonment. About 90% of all suicides are associated with mental disorders. Severe insomnia during the depressive episode, schizophrenic spectrum disorders, bipolar disorders, personality disorders, post-traumatic stress disorder, current recurrent psychotic syndrome, substance abuse are associated with an increased suicide risk. Repeated attempts and mood swings following the administration of antidepressants are frequently associated. **Conclusion.** The risk of repeated suicide attempts is higher for people who have had previous attempts. The identification of risk factors can be used as a method of prevention and intervention. Studies are needed to address the impact of early screening for repetitive suicidal behavior.

**Keywords:** suicide, multiple suicide attempts, risk factors.

## FACTORI DE RISC ÎN TENTATIVELE SUICIDARE MULTIPLE

Mamedova Alina

Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”

**Introducere.** Sinuciderea este o problemă gravă de sănătate publică. Tentativele de sinucidere sunt mai frecvente în comparație cu sinuciderea finalizată. Există, totuși, predictorii importanți ai tentativelor repetate. **Scopul lucrării.** Evaluarea datelor privind factorii de risc în tentativele multiple de sinucidere, pentru a identifica metode de prevenire și de intervenție. **Material și Metode.** Cercetarea a fost realizată în cadrul Catedrei de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală a USMF „Nicolae Testemițanu”. Au fost studiate publicațiile despre tentativele de sinucidere multiple, accesibile pe PubMed. **Rezultate.** Cei mai frecvenți factori de risc pentru tentativele de sinucidere ulterioare sunt cele anterioare. Printre alți factori se regăsesc vârsta medie, șomajul, divorțul, abandonul etc. Circa 90% dintre toate cazurile de sinucidere sunt asociate cu tulburări mintale. Insomnia severă din cadrul episodului depresiv, tulburările din spectrul schizofren, tulburările bipolare, tulburările de personalitate, tulburarea de stres post-traumatic, sindromul psihotic recurent actual și abuzul de substanțe sunt corelate cu un risc suicidar crescut. Tentativele repetate și schimbarea dispoziției, în urma administrării antidepressivelor, sunt frecvent asociate. **Concluzii.** Riscul apariției tentativelor de sinucidere repetate este mai mare pentru persoanele, care au prezentat tentative anterioare. Identificarea factorilor de risc poate fi utilizată ca metodă de prevenire și de intervenție. Sunt necesare studii pentru a aborda impactul screening-ului precoce, pentru comportamentul suicidar repetitiv.

**Cuvinte-cheie:** sinucidere, tentative de sinucidere multiple, factori de risc.