

PSYCHIATRIC EMERGENCIES: PSYCHOMOTOR AGITATION.

Camenscic Olivia

Scientific adviser: Oprea Valentin

Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology, *Nicolae Testemitanu* SUMPh

Background. Psychomotor agitation is a pathological condition characterized by a significant increase in the ideational, emotional, motor and/or behavioral level, which can be accompanied by any psychiatric syndrome and any somatic condition, being the most common psychiatric emergency.

Objective of the study. To study the frequency of the main types of psychiatric emergencies, especially of psychomotor agitations in psychiatric hospitals, depending on the nosological affiliation, age and sex.

Material and Methods. Studying and analyzing the literature during the last 3 years, in the database PubMed, MedScape, Web of Science, to detect the most common mental illnesses accompanied by states of psychomotor agitation that required emergency hospitalization.

Results. The analysis of emergency patients in psychiatric hospitals in Eastern Europe shows that psychomotor agitation develops more frequently patients with schizophrenia (30-34%), manic-depressive psychoses (16-18%) and organic psychoses, and reactive (9-11%) The most common psychiatric emergencies with agitation are reported at the age of 20-30 years. With age, the incidence of emergencies decreases significantly. The distribution of psychiatric emergencies by sex highlights the predominance of females. Only in cases of alcohol intoxication, called "acute drunkenness", psychomotor agitation more frequently develops men. **Conclusion.** Psychomotor agitation remains the most common state of emergency in the total number of hospitalizations in psychiatric hospitals with predominantly endogenous nosological affiliation, constituting 22.5% of the number of patients hospitalized with inpatient psychoses aged 20-30, female.

Keywords: Psychiatric emergencies, psychomotor agitation, prevalence.

URGENȚE PSIHIATRICE – AGITATIA PSIHOMOTORIE

Camenscic Olivia

Conducător științific: Oprea Valentin

Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”

Introducere. Agitația psihomotorie este o stare patologică caracterizată printr-o creștere semnificativă a nivelului ideatic, emoțional, motor și/sau comportamental, ce poate însoți orice sindrom psihiatric și orice afecțiune somatică, fiind cea mai frecventă urgență psihiatrică.

Scopul lucrării. De a studia frecvența principalelor tipuri de urgențe psihiatrice, în special al agitațiilor psihomotorii în spitalele de psihiatrie, în funcție de apartenența nosologică, vârstă și sex.

Material și Metode. Studiarea și analiza literaturii de specialitate pe parcursul ultimilor 3 ani, în baza de date PubMed, MedScape, Web of Science, pentru depistarea celor mai frecvent întâlnite boli psihice însoțite cu stări de agitații psihomotorii ce au necesitat spitalizare de urgență.

Rezultate. Analiza pacienților internați de urgență la spitalele de psihiatrie din zona Europei de Est demonstrează că agitațiile psihomotorii se dezvoltă mai frecvent la bolnavii afectați de schizofrenie (30-34%), de psihoze maniaco-depresive (16-18%) și de psihoze organice și reactive (9-11%). Cele mai frecvente urgențe psihiatrice cu agitații sunt semnalate la vârsta între 20-30 ani. Cu înaintarea în vârstă incidența urgențelor scade semnificativ. Distribuirea urgențelor psihiatrice în funcție de sex evidențiază predominanța sexului feminin. Numai în cazurile intoxicațiilor alcoolice, numite „beții acute”, agitații psihomotorii mai frecvent dezvoltă bărbații.

Concluzii. Agitația psihomotorie rămâne în prezent cea mai frecventă stare de urgență din totalul internărilor în spitalele de psihiatrie cu apartenență nosologică predominant endogenă, constituind 22,5% dintre bolnavii internați cu psihoze în staționare de profil cu vârsta 20-30 ani, sexul feminin.

Cuvinte-cheie: urgențe psihiatrice, agitația psihomotorie, prevalență.