

## CARACTERISTICILE CLINICO-PSIHOPATOLOGICE ALE PACIENȚILOR CU DEMENTĂ

Maria Schidan

(Conducător științific: Ghenadie Cărăușu, dr. șt. med, conf. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală)

**Introducere.** În ultimele decenii numărul pacienților cu demență este în continuă creștere. Potrivit OMS, în prezent există aproximativ 37 de milioane de bolnavi cu această afecțiune. Demența deteriorează memoria, atenția, gândirea, procesele cognitive, starea emoțională, comportamentul.

**Scopul lucrării.** Studiarea particularităților clinico-psihiopatologice ale pacienților cu diferite tipuri de demență.

**Material și metode.** Studiul a fost realizat pe un lot de 15 pacienți cu demență, internați în Spitalul Clinic de Psihiatrie pe parcursul anului 2014. Vârsta medie a bolnavilor – 64,7 ani. Examinarea a inclus chestionarea pacienților, aplicarea testului Mini-Mental State Examination, scalei de anxietate Spielberger și scalei de depresie Montgomery-Asberg.

**Rezultate.** După scala MMSE 13,2% din pacienți prezintă o stare de predemență; 19,8% – demență ușoară; 39,6% – demență moderată; 26,4% – demență severă. Scala Spielberger denotă un nivel mediu de anxietate la 52,8% de pacienți și un nivel înalt – la 47,2%. Scala Montgomery-Asberg atestă o stare depresivă ușoară în 39,6% din cazuri, iar la 12,3% – depresie moderată.

**Concluzii.** (1) Tabloul psihiopatologic al bolnavilor a fost predominat de scăderea memoriei, atenției, capacității de concentrare și de pierderea în greutate. (2) Datele obținute au demonstrat că majoritatea pacienților au prezentat demență mixtă.

**Cuvinte cheie:** demență, anxietate, depresie.

## CLINICAL AND PSYHOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH DEMENTIA

Maria Schidan

(Scientific adviser: Ghenadie Cărăușu, PhD, associate professor, Chair of psychiatry, narcology and medical psychology)

**Introduction.** In recent decades the number of patients with dementia is growing. According to WHO, there are approximately 37 million patients with dementia. Dementia damages memory, attention, mind, cognitive processes, emotional state, behavior.

**Objective of the study.** Study of psychopathological clinical features of patients with different types of dementia.

**Material and methods.** The study was conducted on a sample of 15 patients with dementia hospitalized in the Psychiatric Hospital during 2014. The average age of patients – 64.7 years. The examination included interviewing patients, applying the test Mini-Mental State Examination, Spielberger anxiety scale and depression scale Montgomery-Asberg.

**Results.** By MMSE scale 13.2% of patients present a state of predemențion; 19.8% – mild dementia; 39.6% – moderate dementia; 26.4% – grave dementia. Spielberger scale shows an average level of anxiety in 52.8% of patients and a high level – at 47.2%. Scala Montgomery-Asberg reveal a easy depressed mood in 39.6% of cases and 12.3% – moderate depression.

**Conclusions.** (1) The clinical and psihiopatologic picture of patients was prevailed by decreased memory, attention, ability to concentrate and weight loss. (2) The results showed that most patients had mixed dementia.

**Key words:** dementia, anxiety, depression.