

Rezultatele obținute

Criteriile clinice ale eficacității tratamentului au fost dispariția durerii, stimularea regenerării tisulare și reducerea termenului de tratament comparativ cu metodele tradiționale. Observațiile a 544 de pacienți, au demonstrat că metronidazolul 0,25% si-a dovedit eficacitatea în tratamentul alveolitelor. Din toate formele clinice ale alveolitei, ce au fost supuse acestui tratament, rezultate semnificative au fost obținute, în-deosebi în formele severe și moderate, transformând starea patologică a alveolitei în stare fiziologică de regenerare a plăgii osoase postextractionale.

Concluzii

Utilizarea metronidazolului în tratamentul local al alveolitelor, în-deosebi a formelor severe și moderate,

asigură rezultate semnificative în comparație cu metodele tradiționale.

BIBLIOGRAGIE

1. Бахмутов Б.П., Частота и динамика развития алвеолита в течение года, *Стоматология*, № 3-6, Москва, 1992, с. 37-38.
2. Бернадский Ю.И., Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, Белмедкнига, Витебск, 1998, с. 64-67.
3. Бойко Б.З., Опыт дифференцированной профилактики в лечении алвеолита, *Стоматология*, № 1, Москва, 1993, с. 80-81.
4. Павлов Б.Л., Гапаненко Т.Г., Частота алвеолита после операции удаления зуба, *Стоматология*, № 5, Москва, 1990, с. 80-81.
5. Попович Т.В., Осложнения операции удаления зуба, Алвеолит (причины, диагностика, лечение и профилактика), *Стоматология*, № 4, Москва, 1989, с. 81-82.

ADRESABILITATEA LA MEDICUL STOMATOLOG A ELEVILOR ȘCOLILOR PROFESIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Zepca Victor,
conf. univ., dr.,

Iziumov Nina,
drd.,

Ciobanu Anatolii,
medic stomatolog
categoria superioară,

Baroncea Angela,
profesor

Institutul de Neurologie
și Neurochirurgie,
Centrul Național
Științifico-Practic de
Medicină Preventivă,
C.Î.I. „I. Cheptea“
Dentaurum, mun. Bălți,
Colegiul Național de
Medicină și Farmacie

Introducere

Prezentarea regulată la medicul stomatolog în lipsa unei boli aparente asigură depistarea precoce a bolilor cavității bucale și evitarea posibilităților complicații. Scopul cercetării a fost de a studia adresabilitatea la medicul stomatolog pentru o verificare, detartraj sau alte tratamente stomatologice a elevilor din instituțiile de învățământ profesional secundar din Republica Moldova.

Material și metodă

Utilizând metoda chestionarului, pe un lot de 762 persoane (fete — 343, băieți — 419) din 14 școli profesionale cu termenul de instruire 3 ani din mun. Chișinău și raioanele Republicii Moldova, s-au cules informații despre adresabilitatea la medici specialiști, inclusiv la stomatolog.

Rezultate

Din rezultatele chestionării elevilor școlilor profesionale rezultă că nu s-au adresat medicului stomatolog pentru o verificare, detartraj sau alte tratamente stomatologice 40,3% elevi; cu mai mult de 24 luni în urmă s-au adresat 15,0%; între 12 și 24 luni — 13,1% și în ultimele 12 luni — 31,6%. Adresarea precoce la medicul stomatolog este diferită în lotul de fete și băieți: în ultimele 12 luni, ce au precedat chestionarea, au apelat la medicul stomatolog 35,3% fete și 28,6% băieți. Specialitatea medicului, la care au apelat ultima dată elevii din școlile profesionale este nominalizată stomatologul în 4,4% cazuri de către fete și 1,9% de către băieți.

Concluzii:

- Adresabilitatea elevilor școlilor profesionale la medicul stomatolog este joasă;
- Fetele manifestă, comparativ cu băieții, o prezență la medicul stomatolog mai frecventă și mai precoce.

Recomandări:

- Este necesar de a forma la copii și adolescenți practica de a face controlul regulat la medicul stomatolog cu scopul de menținere a sănătății cavității bucale. Rolul primordial în această activitate le revine instituțiilor de învățământ preșcolar și preuniversitar sub controlul specialiștilor din domeniu.