

## FACTORI ETIOLOGICI ÎN TULBURAREA DE PERSONALITATE HISTRIONICĂ

Victoria Lungu, Ghenadie Cărăușu

Conducător științific: Ghenadie Cărăușu

Catedra de Sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, USMF „Nicolae Testemițanu”

**Introducere.** Prevalența tulburării de personalitate histrionică (TPH) este de aproximativ 2-3%. În mediul clinic TPH a fost diagnosticată mai frecvent la femei; totuși, raportul pe sexe nu este semnificativ diferit. Elementul esențial îl constituie emoționalitatea excesivă și comportamentul de căutare a atenției. **Scopul lucrării.** Analiza literaturii privind factorii etiologici ai pacienților cu tulburare de personalitate histrionică. **Material și metode.** Studiarea datelor literaturii de specialitate din sursele științifice publicate în baza de date PubMed, MedScape, Web of Science. **Rezultate.** Ca și în cazul multor tulburări psihice, antecedentele familiale de tulburări de personalitate, boli psihiatrice sau tulburări de consum de substanțe reprezintă un factor de risc pentru tulburarea de personalitate histrionică. O ipoteză este că TPH se poate dezvolta ca urmare a traumei experimentate în timpul copilăriei. Copiii pot îndura trauma făcând față mediului lor în moduri care pot duce în cele din urmă la o tulburare de personalitate. Stilurile parentale pot influența probabilitatea de a dezvolta o TPH. Un părinte care nu are limite, fiind excesiv de indulgent sau inconsecvent, sau care modelează un comportament sexual dramatic, își expun copiii la risc crescut de a dezvolta această tulburare de personalitate. **Concluzii.** Tulburarea histrionică de personalitate este rezultatul unei interacțiuni complexe între factorii genetici, psihologici, de mediu și socio-culturali. **Cuvinte-cheie:** etiologie, factori, tulburare histrionică de personalitate.

## ETIOLOGICAL FACTORS IN HISTRIONIC PERSONALITY DISORDER

Victoria Lungu, Ghenadie Cărăușu

Scientific adviser: Ghenadie Cărăușu

Department of Mental Health, Medical Psychology and Psychotherapy, Nicolae Testemițanu University

**Background.** The prevalence of histrionic personality disorder (HPD) is approximately 2-3%. In the clinical environment, HPD was more frequently diagnosed in women; however, the gender ratio does not differ significantly. The essential element of this disorder is excessive emotionality and attention-seeking behavior. **Objective of the study.** Literature analysis on etiological factors of patients with histrionic personality disorder. **Material and methods.** Studying the specialized literature data from the scientific sources published in the PubMed, MedScape, Web of Science database. **Results.** As many mental disorders, a family history of personality disorder, psychiatric illness, or substance use disorder are risk factors for histrionic personality disorder. One hypothesis is that HPD may develop because of trauma experienced during childhood. Children can endure trauma by coping with their environment in ways that can eventually lead to a personality disorder. Parenting styles may also influence the likelihood of developing a HPD. A parent, who has no boundaries, is overly indulgent or inconsistent, or who models dramatic sexual behavior puts their children at increased risk of developing this personality disorder. **Conclusion.** Histrionic personality disorder is the result of a complex interaction between genetic, psychological, environmental, and socio-cultural factors. **Keywords:** etiology, factors, histrionic personality disorder.