

PARTICULARITĂȚI CLINICO-EVOLUTIVE ȘI PARACLINICE ALE ULCERULUI GASTRIC ȘI DUODENAL ÎN ASOCIERE CU PANCREATITA CRONICĂ

Ecaterina Șcepilova

(Cond. șt. – Ghenadie Bezu, dr. șt. med., conf. univ., Clinica Medicală nr.7)

Introducere. Grație topografiei anatomice și interrelațiilor fiziologice foarte strânse între stomac, duoden și pancreas, afectarea unuia dintre aceste organe poate provoca dereglări funcționale și chiar organice din partea celorlalte organe, ceea ce a și determinat scopul studiului.

Scop. Studiarea particularităților clinico-evolutive și paraclinice ale ulcerului gastric și duodenal în asocieră cu pancreatita cronică.

Material și metode. Au fost investigați 2 loturi de pacienți, I - 12 pacienți cu ulcer gastric și duodenal (UGD) în acutizare fără pancreatită cronică asociată și II - 19 pacienți cu UGD în acutizare asociat cu pancreatită cronică.

Rezultate. I lot- au manifestat pirozis (n=9), meteorism (n=3), xerostomie (n=5), grețuri (n=8), pierdere ponderală (n=5), vome (n=2), complicații (n=1). II lot- pirozis (n= 13), meteorism (n=15), xerostomie (n=9), grețuri (n= 12), pierdere ponderală (n= 3), vome (n= 7), constipații (n= 6), complicații (n=7).

Concluzii. Particularitățile clinice ale UGD în asocieră cu pancreatita cronică sunt caracterizate prin faptul, că la simptomele caracteristice UGD se adaugă cele ale pancreatitei cronice, cu sindrom dispeptic mai pronunțat, cu meteorism și constipații, cu o incidență mai crescută a vomelor, iar durerea își schimbă caracterul. Deseori se atestă dereglări ușoare a funcțiilor exocrine ale pancreasului. Evolutiv este caracteristică apariția mai frecventă a complicațiilor, în primul rând a hemoragiei.

Cuvinte cheie. Ulcer gastric și duodenal, pancreatita cronică

CLINICAL FEATURES, COURSE AND PARACLINICAL DATA OF GASTRIC AND DUODENAL ULCERS WITH CONCOMITANT CHRONIC PANCREATITIS.

Ecaterina Șcepilova

(Sci. adviser: Ghenadie Bezu, Ph.D., associate prof., Clinique nr.7)

Introduction. Due to the anatomical topography and very close physiological relationship between stomach, duodenum and pancreas, the impairment of one of these organs can cause functional and even organic disorders from the side of other organs.

Purpose. The study of the clinical features, course and paraclinical data of gastric and duodenal ulcers with concomitant chronic pancreatitis.

Material and methods. Two groups of patients were investigated, I - 12 patients who have acute gastric and duodenal ulcers without concomitant chronic pancreatitis, and II - 19 patients who have gastric and duodenal ulcers with concomitant chronic pancreatitis.

Results. *First group manifested heartburn* (n=9), bloating (n=3), xerostomia (n=5), nausea (n=8), weight loss (n=5), vomiting (n=2), complications (n=1). *II group - heartburn* (n= 13), bloating (n=15), xerostomia (n=9), nausea (n= 12), weight loss (n= 3), vomiting (n= 7), constipation (n= 6), complications (n=7).

Conclusions. Clinical features of gastric and duodenal ulcers in association with chronic pancreatitis are characterized by the fact that to the characteristic symptoms of gastric and duodenal ulcer are added symptoms of chronic pancreatitis with a more pronounced dyspeptic syndrome, bloating and constipation and more frequent vomiting, but pain changes its character. These patients are observed to have light disorders of exocrine functions of the pancreas. The evolution is characterized by more frequent complications, primarily by hemorrhage.

Key words. Gastric and duodenal ulcers, chronic pancreatitis