

PARTICULARITĂȚILE CLINICO-PSIHOPATOLOGICE ALE STĂRII DE SĂNĂTATE A PERSOANELOR CARE TRĂIESC CU HIV/SIDA

Djunico Elvira

(Cond. șt. – Cărăușu Ghenadie, dr. șt. med., conf. univ., cat. Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală)

Introducere. Frecvența înaltă și severitatea tulburărilor mentale la pacienții afectați de HIV/SIDA conturează o problemă medico-socială importantă.

Scop. Studierea factorilor implicați în dezvoltarea de tulburări mintale la pacienți cu HIV/SIDA, studierea particularităților psihopatologice și metodelor de tratament.

Material și metode. Cercetarea a fost realizată în cadrul Dispanserul Dermato-Venerologic Republican. Au fost examinați 18 pacienți cu HIV/SIDA. Cercetarea a fost efectuată confidențial: utilizat Statutul Mini-Mental (MMSE), scala de autoevaluare a anxietății situative (reactive) Spilbergher și scala de depresie Beck (BDI).

Rezultate. Au fost identificați factori care duc la apariția tulburărilor psihice la pacienții cu HIV/SIDA: utilizarea substanțelor psihoactive în anamneză (78%); șomajul și pierderea capacității de lucru (63%); traumatismul cranio-cerebral în anamneză (56%); izolare socială (56% nu au partener permanent, 30% locuiesc singuri). A fost identificat un nivel ridicat de anxietate în 28% dintre pacienți, nivel mediu - 72%. Mai mult de jumătate dintre pacienți (67%) au depresie de diferite grade. Tulburări cognitive au fost observate în 50% dintre pacienți (pre-demența - 44% și 6% - demență moderată). Pentru pacienți cu depresie au fost prescrise antidepresive; pentru cei cu tulburări de anxietate – tranchilizante, iar pentru pacienții cu tulburări cognitive – preparate nootrope.

Concluzii. Cauzele tulburărilor mentale la pacienții afectați de HIV/SIDA sunt multifactoriale, nespecifice. Majoritatea pacienților au anxietate sau depresie. Jumătate dintre pacienții au tulburări cognitive.

Cuvinte cheie. HIV/SIDA, anxietate, depresie, tulburări cognitive.

CLINICAL PSYCHOPATOLOGICAL FEATURES OF THE STATE OF HEALTH IN PATIENTS WITH HIV/AIDS

Elvira Djunico

(Sci. adviser: Gennady Carausu, MD., associate prof., chair of Psychiatry, Narcology and Medicopsychology)

Introduction. Wide prevalence of HIV infection marked psychic disturbances lead to up-to-dateness of the problem.

Purpose. Research of factors involved in the development of psychical disorders of patients with HIV/AIDS, study of psychopathological characteristics and treatment methods.

Material and methods. Were examined 18 patients with HIV/AIDS on the basis of the Republican Dermato-Venereological Clinic. The study included questionnaires (confidential), completing quests from the Mini-mental State Examination, independent answer for the questions of scale of self-appraisal of situational (reactive) anxiety Spilbergher and Beck Depression Inventory.

Results. Identified factors that predispose to psychical disorders in patients with HIV/AIDS: the use of psychoactive substances in anamnesis (78%); unemployment and loss of professional work capacity (63%); brain injury in anamnesis (56%); social exclusion (56% lock of a regular partner, 30% live alone). 28% of patients have a high level of anxiety, 72%. – medium. 67% of the patients have depression of varying degrees. Cognitive impairment was observed in 50% of patients (44% - pre-dementia and 6% - dementia of moderate severity). In patients with depression antidepressants were prescribed; in patients with anxiety disorders-tranquilizers, and in patients with cognitive impairment – nootropics.

Conclusions. Causes of mental disorders of patients with HIV/AIDS are nonspecific, multifactorial. Most patients have anxiety and depression. Only half of patients have cognitive impairment.

Key words. HIV/AIDS, anxiety, depression, cognitive disorders.