

INFLUENȚA FACTORILOR SOCIALI ASUPRA EVOLUȚIEI SCHIZOFRENIEI

Dorosevici Alexandr

(Cond. șt. - Deliv Inga, dr. șt. med., conf. univ., cat. de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie clinică).

Introducere. Schizofrenia este o maladie psihiatrică, ce atrage o atenție deosebită, din motivul impactului social imens, mai ales din motivul capacității sale de invalidizare și excludere din viața socială a suferindului. Manifestările clinice a acestei boli, sunt asemănătoare peste tot în lume, însă prezența sau absența unor factori sociali modifică semnificativ evoluția schizofreniei, în sens pozitiv sau negativ. Studiul ar permite elobararea recomandărilor pentru a reduce numărul recăderilor, volumul tratamentului farmacologic și a crește capacitatea de participarea socială a pacienților, aplicând măsurile de reabilitare adecvate.

Scop. Identificarea factorilor sociali cu impact asupra evoluției schizofreniei. Examinarea posibilității de a reduce influența factorilor cu impact negativ.

Rezultate. Din reviuul literaturii se cunoaște că 10-20 % din pacienți schizofreni nu sunt asistați psihiatric, iar incidența îmbolnavirii este între 0,17~0,54 la 1000 persoane/an. Riscul morbid pentru schizofrenie constituie vârsta 15-44(54)ani. Venituri reduse la -70% de pacienți, În mediu urban prevalența schizofreniei este mai mare decât în mediul rural cu 7,11% . Comorbiditatea cu alcoolism este egală cu 57%, iar narcomaniile 24-41%. Fumatul se întâlnește de 2,3 ori mai des la schizofreni decât în populația generală. Speranța de viață acestori pacienți este cu 20% mai scăzută decât la populația generală. Mortalitatea fiind mai mare la bărbați decât la femei.

Concluzii. sărăcia, reședința urbană, viciile sunt factori sociali principali cu impact negativ asupra evoluției schizofreniei .

Cuvinte cheie. Riscul de boală, factori sociali, schizofrenie.

INFLUENCE OF THE SOCIAL FACTORS ON THE EVOLUTION OF SCHIZOPHRENIA

Dorosevici Alexandr

(Sci. adviser: Deliv Inga, PhD., associate prof., chair of Psychiatry, Narcology and Clinical Psychology)

Introduction. Schizophrenia is a psychiatric illness that has a huge social impact, particularly due to its capacity for invalidity and exclusion from the social life of the patients. Clinical manifestations of this disease are similar everywhere, but the presence or absence of social factors significantly alter the development of schizophrenia positively or a negatively. The study would allow elaborating recommendations in order to reduce the number of relapses and to increase the capacity of social participation of patients.

Purpose. Identification of the impact of social factors on the course of schizophrenia, examining the possibility of reducing the influence of the factors with a negative impact.

Results. In the literature review we find that 10-20% of schizophrenic patients don't have psychiatric examination, but the incidence of the disease is between 0.17~0.54 to 1000 persons/year; 70% of the patients have a low-income. The prevalence of schizophrenia is 7.11% higher in the urban than the rural area. The comorbidity with alcohol -57% and 24-41% with drug addiction. Smoking is 2.3 times more often in schizophrenic than in general population. Life expectancy in these patients is 20% lower than in the general population. Mortality is higher in men than in women.

Conclusions. Poverty, urban residence, vices are the main factors with a negative impact on the development of schizophrenia.

Key words. Illness risk, social factors, schizophrenia.