

estimează că studierea profilului molecular/genetic al tumorilor colorectale va dicta în viitor deciziile terapeutice de urmat. Cuvinte cheie: cancerul colorectal, markeri moleculari, factori de prognostic

PROGNOSTIC FACTORS IN COLORECTAL CANCER EVOLUTION

Background. This paper tries to evaluate prognostic value of various pre and post-operative colorectal cancer markers. Material and methods. In the study conducted in our clinic over a period of five years we tried to emphasize the biological factors of prognostic value in colorectal cancer, and to demonstrate the important role of these factors in predicting survival, but also of early relapse or, in some cases, resistance to chemotherapy. Most important component of these factors remains molecular tumor markers. Results. Of the markers of tumor load increased preoperative serum levels of carcinoembryonic antigen (CEA) means increased risk of neoplastic recurrence and reducing survival expectancy. Aneuploidy tumor cells would have the same importance. Conclusions. Although for their study modern and expensive techniques are necessary, molecular tumor markers have an increasingly role appreciated by researchers both in estimating the risk of relapse and neoplastic dissemination and the response rate to adjuvant treatment. It is estimated that the study of molecular/genetic profile of colorectal tumors in the future will dictate therapeutic decisions ahead.

D84

FALS ABDOMEN ACUT CU IMPLICATII MEDICO-LEGALE

Ghiur M., Ghiur Luminița, Zbucnea A.

Spit. CF 2

Bolnul A.M. de 26 de ani se interneaza in garda pentru dureri abdominale, greturi urmate de varsaturi, stare subfebrila. Analizele de urgență consemneaza doar o leucocitoza de 8000. Se pune diagnosticul de apendicită acută și se practica in urgență apendicectomie. Intraoperator, aspectul morfologic al apendicelui nu justifica simptomatologia bolnavului (fig. 1). Postoperator, starea generală se agravează brutal, instalându-se un sindrom de ocluzie intestinală. Considerandu-se o complicație postoperatorie, se reintervine in a 4-a zi de evoluție nefavorabilă. Intraoperator nu se constată decat un ileus dinamic și ingrosarea apreciabilă a mezenterului. S-a practicat ileostomie de degajare (fig. 2). Evoluție postoperatorie nefavorabilă. Se instalează același sindrom de ocluzie intestinală. Starea bolnavului devine critică. Transfer la Clinica de chirurgie Spitalul Floreasca. După o reevaluare clinica și paraclinica se practica o nouă reinterventie chirurgicală pentru același sindrom de ocluzie intestinală, cand se constată un mezenter mult ingrosat, de 8-10 cm, și staza în circulația portală (fig. 3). Evoluția postoperatorie este gravă cu deces în a 5-a zi prin stop cardio-respirator. Cazul este trimis direct la Institutul de Medicina Legală pentru malpraxis intr-o operatie de apendicectomie. După 60 de zile, concluzia IML: Sindrom Budd-Chiari prin ingestie de alcool metilic, producand o endoflebită ocluzivă pe venele suprahepatice cu bloc posthepatic ce a dezvoltat o forma malignă de hipertensiune portală cu evoluție letală.

FALSE ACUTE ABDOMEN WITH MEDICAL - LEGAL IMPLICATIONS

The patient A.M., 26 years old, is urgently hospitalized for abdominal pains, nausea followed by eructation, subfebrile temperature. The emergency analyses show only a leukocytosis of 8000. It is diagnosed as acute appendices and it is practiced an appendicectomy. During surgery, the morpho-pathological aspect of the appendix does not justify the symptomatology of the patient. (Figure 1). After surgery, the general state was brutally exasperated, with the syndrome of intestinal occlusion. Being considered a post-surgery complication, it shall be intervened in the forth day of unfavorable evolution. During surgery, it is not observed nothing but a dynamic ileus and the severe swelling of mesentery. It was practiced ileostomy of release. (Figure 2). Unfavorable post-surgery evolution. It is observed the same syndrome of intestinal occlusion. The physical state became critical. Transfer to the Surgery Clinic, Floreasca Hospital. After a clinical and paraclinical reevaluation it is practiced a new surgical intervention for the same syndrome of intestinal occlusion and it is observed a thicker mesentery, of 8-10 cm, and stasis in portal circulation (Figure 3). Post – surgery evolution is critical with death in the fifth day, by cardiopulmonary arrest. The case is sent directly to the Institute of Forensic medicine for malpractice in appendicectomy surgery. After 60 days, the IML conclusion: syndrome Budd-Chiari by ingestion of methyl alcohol, producing an occlusive endophlebitis on the suprahepatic veins with post-hepatic blocks which developed a malign form of portal hypertension with lethal evolution.

D85

CONSIDERAȚII CLINICO-TERAPEUTICE ASUPRA UNUI CAZ RAR DE OCLUZIE INTESTINALĂ

Darii E.

Clinica Chirurgie II, Târgu Mureș

Introducere: Ocluzia intestinală reprezintă 20% din totalul cazurilor de abdomen acut chirurgical din România. Cunoaștem 4 tipuri majore de cauze: sindrom aderențial peritoneal post-operator, tumori intestinale, volvulus intestinal, hernii sau eventrații abdominale strangulate. Herniile abdominale interne (paroduodenale, transmezenterice, pericecale, intersigmoidiene, paravezicale) reprezintă 0,2%-0,4% din toată patologia herniară. Material și metodă: Vom relata cazul unei paciente internate în urgență cu abdomen acut chirurgical și semne de ocluzie intestinală. Pacienta în vîrstă de 21 ani