

- [3] E.Ioniță,I.Ioniță,A.Florin “Implicațiile supurațiilor auriculare în apariția complicațiilor supurative”studiu clinic;clinica Orl ,UMF Craiova,Revista Română de ORL,2003 –vol 25. nr. 2:120-122.
- [4] Samuel J, Fernandes CM, Steinberg JL. Intracranial otogenic complications: a persisting problem. Laryngoscope 1996 Mar; 96(3): 272-8.
- [5] S.Vetrician, A. Antohi, A. Bajureanu, E. Cernolev -Aspectele clinice,morfopatologice și microbiologice ale „maladiei urechii operate” Curierul medical nr.5(311),2009.
- [6] www.ms.md// Protocol clinic național „Otita medie cronică supurată la adult”, Chișinău 2008.

TONSILOFARINGITA CRONICA
Vladimir Popa, Amer Ayman, Ofelia Ivas
 Catedra ORL, USMF „Nicolae Testemitanu”

Summary

Tonsilo chronic pharyngitis is a current problem of otorhinolaryngology. This work describes the signs of the disease subjective and objective. The authors conclude that tonsilo pharyngitis is a new nosological form that needs to be included in the nomenclature of diseases.

Rezumat

Tonsilofaringita cronică prezintă o problemă actuală a otorinolaringologiei. În lucrare se descriu semnele subiective și obiective ale acestei afecțiuni. Autorii concluzionează că tonsilo faringita este o formă nozologică nouă și necesită de a fi inclusă în nomenclatorul afecțiunilor.

Actualitatea

Otorinolaringologii, precum și medicii de familie, în activitatea cotidiană a lor se întâlnesc cu bolnavi care prezintă multiple și diverse plângeri, care pot caracteriza atât tonsilita cronică, cât și faringita cronică. În aceste două afecțiuni luate aparte, lamureșc faptul că în caz de tonsilita cronică are loc inflamația tonsilelor palatine. În faringita cronică se caracterizează prin inflamația cronică a mucoasei faringelui.

În literatura de specialitate ne întâlnim cu tonsilofaringitele acute, mai ales cu etiologie virală.

Tonsilita cronică, precum și faringita cronică (tonsilofaringita cronică), în pofida faptului că au o istorie de milenii de ani, totuși, și în zilele noastre rămân o problemă actuală. Actualitatea acestei afecțiuni se lamurește prin:

- Incidența înaltă a ei în sinul populației și nu are tendința de a diminua;
- Rolul etiologic a multor factori microbieni și a altora de ordin favorizanti și predispozanti;
- Mecanismul complex de dezvoltare și menținere a procesului patologic în faringe;
- Dificultatea de diagnostic, mai ales a diagnosticului diferențial dintre diferite forme de tonsilită și faringită cronică;
- Complicațiile pe care le pot provoca aceste afecțiuni aparte și tonsilofaringita cronică în particular;
- Lipsa unui algoritm de diagnostic și tratament adecvat și eficient a tonsilofaringitelor cronice;
- În literatura de specialitate, tonsilofaringita cronică nu este inclusă în nomenclatorul afecțiunilor otorinolaringologice, fapt ce duce la aceea că asemenea patologii nu se pun sub evidența statistică;

- Este greu de diagnosticat, foarte dificil de a face un diagnostic diferential dintre tonsilita cronica si faringita cronica si dintre tonsilofaringita cronica si vice versa.

Scopul

Familiarizarea otorinolaringologilor, medicilor de familie si a altor specialisti cu o noua entitate nosologica: „Tonsilofaringita cronica”.

Sarcinile studiului

- Examinarea a 1500 de persoane locuitoare in satele Moldovei, cu scop de a determina patologia ORL in general, si faringiana in special;
- Studiarea a 500 de foi de observatie si alte documente medicale, pentru a acumula date despre patologia faringiana;
- Descrierea semnelor subiective si obiective la persoanele examinate in ceea ce priveste tonsilofaringita cronica;
- Evidentierea celor mai frecvente si caracteristice simptome clinice a tonsilofaringitelor cronice;
- Propunerea algoritmului de diagnostic si tratament a tonsilofaringitelor cronice;
- Consultatiile a 1072 de bolnavi din sectiile SCR si din alte IMSP

Materiale si metode

Morbiditatea populatiei locuitoare in satele Republicii Moldova prin tonsilofaringita cronica a fost prin examenul otorinolaringologic a 1500 de persoane.

Examenul a avut loc in 38 de sate Republicii Moldova, care au cuprins 16 raioane. La cele 1500 de persoane examinate in satele Republicii Moldova, s-au mai examinat 1072 persoane din sectiile SCR si din alte IMSP ale Republicii Moldova, si 500 foi de ambulator.

Repartizarea persoanelor examinate se prezinta in tabelul 1:

Nr.de ord.	Virsta	Numarul de persoane	In procente (%)
1.	1-5 ani	140	4,6
2.	6-10ani	109	3,5
3.	11-20ani	260	8,5
4.	21-25ani	280	9,0
5.	26-30ani	232	7,5
6.	31-35ani	580	18,9
7.	36-40ani	490	16,0
8.	41-50ani	370	12,0
9.	51-60ani	210	7,0
10.	61-70ani	191	6,0
12.	Peste 70ani	210	7,0
	Total	3072	100

Datele din tabelul 3 ne permit de a face urmatoarele concluzii:

- Tratamentul conservator al tonsilofaringitelor cronice este argumentat si s-a dovedit are o eficacitate inalta;
- Diferenta eficacitatii dintre grupele de bolnavi nu este semnificativa;

Cu alte cuvinte, ambele metode de tratament conservator al tonsilofaringitei cronice sunt eficiente.

Tonsilofaringita cronică a fost diagnosticată la 47,8% din persoanele examinate.

Plingerile persoanelor cu tonsilofaringită cronică au fost (tabelul 2):

Nr.de ord.	Acuzele bolnavilor examinati	Numarul de persoane	In Procente(%)
1.	Senzatie de durere in (odinofagie)	1286	41,9
2.	Senzatie de „Nod in git”	1127	36,7
3.	Disconfort in git	785	25,5
4.	Angina in anamneza	973	31,7
5.	Formarea si eliminarea dopurilor de cazeum	487	15,6
6.	Dificultatea la deglutitie (disfagie)	318	10,3
7.	Miros urit din gura	280	9,1
8.	Sialoree	307	10,0
9.	Respiratie bucala	104	3,4
10.	Tuse	506	16,5
11.	Subfebrilitate	432	14,1
12.	Senzatie de corp strain in git	180	5,8
13.	Oboseala generala	385	12,5
14.	Pierderea capacitatii de munca	219	7,1
15.	Uscaciune in git	598	19,5
16.	Intepaturi in git	426	13,9

Bolnavii, unii din ei au fost supusi unui tratament medical care includea:

Tabelul 3

Rezultatul tratamentului bolnavilor cu tonsilofaringită cronică în dependență de grupă de bolnavi și metoda de tratament aplicată

Nr. de ord	Rezultatele tratamentului	Rezultatele tratamentului			
		Pozitive		Negative	
	Grupa de bolnavi si metoda de tratament	Numarul de bolnavi	Procente (%)	Numarul de bolnavi	Procente (%)
1.	-Gargarisme cu solutie Trachisan 2ori pe zi,15 zile -Badijonarea mucoasei mezofaringiene cu solutie Lugoli 1%-15zile -Acidi ascorbici (vitamina C) 0,5 de 3ori pe zi,15zile -Suprastin 25mg ,o data pe zi, seara-15zile N50	38	76,0	12	24 p=<0,05
2.	-Gargarisme cu solutie Nucina 1:7 si 1:10,in dependenta de forma tonsilitei cronice-2ori pe zi,15zile - Badijonarea mucoasei mezofaringiene cu solutie Lugoli 1%-15zile -Acidi ascorbici 0,5 x3ori pe zi,15zile -Suprastin 25mg,o data pe zi, 15zile N50	39	78,0	11	22 p=<0,05

Concluzii generale

1. Tonsilofaringita cronică este o entitate nozologică bine determinată, etiopatogenic, simptomatologică și a tratamentului.
2. Tonsilofaringitei cronice i se impune, preponderent, un tratament conservator.
3. Acest grup de bolnavi au nevoie de a fi la evidență dispanserică atât la medicul otorinolaringolog, cât și la medicul de familie.

Bibliografie

1. Popa Vladimir, Antohi Ion, Osman V.: „Tratamentul conservator al tonsilitei cronice”. „Anale științifice”, editia a VII-a. Volumul IV. „Probleme clinico-chirurgicale”. Chisinau 2006, pag.250-253.
2. Popa Vladimir „Rolul anamnezei în diagnosticul afecțiunilor otorinolaringologice.” „Recomandări metodice.” Chisinau 2011, pag.22.
3. Popa Vladimir „Morbiditatea otorinolaringologică a populației rurale din Republica Moldova”. Chisinau 2011, pag.21.

TRATAMENTUL MEDICAMENTOS AL TONSILOFARINGITEI CRONICE

Vladimir Popa, Ayman Amer

Catedra ORL, USMF “Nicolae Testemițeanu”

Summary

Drug treatment of chronic tonsillopharyngitis is difficult. Lately, new remedies have been proposed for medical treatment of many diseases. But new preparations of chronic tonsillopharyngitis treatment is not used. The authors have used some methods and new drugs to treat chronic tonsillopharyngitis, such as sol. Myromistină 0.01% sol. Chlorhexidine 0.05%, sol. Nucină 1/7 and 1/10, sol. Trachisan, and others.

Rezumat

Tratamentul medicamentos al tonsilofaringitei cronice este dificil. În ultimul timp, au fost propuse noi remedii pentru tratamentul medicamentos al multor afecțiuni. Însă preparatele noi în tratamentul tonsilofaringitei cronice nu se folosesc.

Autorii au utilizat unele metode și medicamente noi în tratamentul tonsilofaringitei cronice, cum ar fi: sol. Myromislină 0.01 %, sol. Clorhexidină 0.05%, sol. Nucină 1/7 și 1/10, sol. Trachisan, și altele.

Actualitatea

Tonsilofaringita cronică prezintă o problemă actuală și în același timp dificilă. Aceasta se explică prin faptul că tonsilofaringita cronică nu se studiază de otorinolaringologi și de alți medici. În practica medicală se utilizează de rinofaringită sau tonsilofaringită acută de origine virală sau bacteriană. Însă în același timp s-a stabilit (Vl. Popa 2011) că tonsilofaringita cronică s-a diagnosticat la 40,7% dintre cei 1600 de persoane examinate. Incidența tonsilofaringitei cronice după cum s-a constatat este înaltă. Atât tonsilita cronică cât și faringita cronică, sunt afecțiuni cu o răspândire largă în rândul populației.

Vl. Popa (1986) a stabilit că după tonsilectomie la bolnavi se dezvoltă faringita cronică-afecțiune foarte supărătoare pentru cei afectați. La unii bolnavi este dificil de stabilit care dintre afecțiunile mezofaringelui sunt mai grave: tonsilita sau faringita. Multe dintre simptomele acestor maladii se întâlnesc la ambele entități nozologice. De aceea o importanță deosebită o are tratamentul medical al acestei patologii.