



FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ DURATA AMENOREEI DE LACTAȚIE

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Catedra Obstetrică și Ginecologie

Autor: Micu Parascovia, medic- rezident Obstetrică și Ginecologie, anul III.

Conducător științific: Ciobanu Victor, conferențiar universitar.

INTRODUCERE:

Durata amenoreei postpartum prezintă o variabilitate individuală și depinde de mai mulți factori, cum ar fi: durata și frecvența alăptării, vârsta și paritatea mamei, adaosul ponderal pe parcursul sarcinii, indicele de masă corporală, intervalul între nașteri.



Scopul lucrării


De a determina cum este influențată perioada de amenoree post-partum de diferiți factori materno-fetali.

S-au analizat 16 surse bibliografice identificate în bazele de date: Genetics Home Reference, PubMed, MedScape, Medline.

Materiale și metode

REZULTATE:


Alăptarea ca metodă de contracepție



Factori care cresc perioada de amenoree



Factori care scad perioada de amenoree



CONCLUZII: Durata amenoreei post-partum este mai mare pentru mamele care alăptează exclusiv la sân, pentru mamele cu vârstă înaintată, cu paritate mai mare și cu interval mai mare între nașteri.

CUVINTE CHEIE: amenoree postpartum, alăptare exclusivă, vârstă, paritatea, nutriție.