

CZU: 615.15:616.858-085.2.065

## ROLUL FARMACISTULUI ÎN GESTIONAREA EVENIMENTELOR ADVERSE ÎN FARMACTERAPIA BOLII PARKINSON

Mohamed Nassef Moncef GOUBA\*, Vladimir ELENI,  
Corina SCUTARI

*Catedra de farmacologie și farmacie clinică  
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  
din Republica Moldova*

Autor corespondent\*: [goubanacef@gmail.com](mailto:goubanacef@gmail.com)

Conducător științific: Corina SCUTARI, dr. șt med. conf. univ.

**Introducere.** Farmacoterapia în boala Parkinson (BP) este esențială pentru gestionarea simptomelor motorii și non-motorii, însă este frecvent asociată cu evenimente adverse (EA), cum ar fi diskineziile, halucinațiile și hipotensiunea ortostatică, care afectează calitatea vieții pacienților. Farmaciștii joacă un rol crucial în abordarea acestor EA, prin optimizarea tratamentelor, educarea pacienților și colaborarea în echipe multidisciplinare pentru a îmbunătăți siguranța și eficacitatea tratamentelor.

**Scopul lucrării.** Explorarea rolului farmaciștilor în reducerea EA din timpul farmacoterapiei BP și îmbunătățirea rezultatelor terapeutice generale.

**Material și metode.** A fost realizată o revizuire a articolelor de specialitate, ghidurilor clinice și studiilor din baze de date precum PubMed și ClinicalTrials.gov. Cuvintele-cheie utilizate au inclus „boala Parkinson,” „evenimente adverse,” „rolul farmacistului” și „siguranța medicației”.

**Rezultate.** Farmaciștii au un rol important în gestionarea EA în BP. Aceștia ajustează dozele de levodopa pentru a reduce diskineziile,

sugerează alternative pentru halucinațiile cauzate de agoniștii dopaminei și educă pacienții cu privire la aderența la tratament și recunoașterea timpurie a EA. De asemenea, recomandă terapii personalizate, cum ar fi formulările cu eliberare controlată sau terapiile adjuvante, precum inhibitorii COMT sau MAO-B. Prin aceste intervenții, farmaciștii îmbunătățesc controlul simptomelor, reduc complicațiile și cresc calitatea vieții pacienților.

**Concluzii.** Farmaciștii au un impact semnificativ în gestionarea EA din cadrul farmacoterapiei BP, asigurând tratamente mai sigure și mai eficiente. Integrarea lor în echipele de îngrijire multidisciplinare este esențială pentru optimizarea rezultatelor terapeutice și îmbunătățirea calității vieții pacienților.

**Cuvinte cheie:** boala Parkinson, evenimente adverse, farmacoterapie, rolul farmacistului, siguranța tratamentului.

### **ORCID-ul autorilor**

Vladimir Eleni <https://orcid.org/0009-0003-5747-9972>

Corina Scutar <https://orcid.org/0000-0001-5390-5493>