

## POVESTEA UNEI HIPERMETROPII ASCUNSE

Mariana Țurcan, Corina Magdei

*Catedra de oftalmologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova*

*Secție de oftalmologie, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Clinica ”Emilian Coțaga”, Chișinău Republica Moldova*

**Introducere.** Spasmul acomodativ reprezintă o tulburare funcțională a acomodării, care poate mima o miopie importantă, determinând scăderea bruscă a acuității vizuale. Depistarea corectă a unui spasm acomodativ real este esențială pentru a evita supradiagnosticarea miopiei și prescrierea unei corecții optice nejustificate, cu implicații asupra dezvoltării vizuale a copilului.

**Materiale și metode.** Prezentarea unui caz clinic al unui adolescent de 12 ani, adresat cu scăderea bruscă a vederii, evidențiind rezultatele evaluării clinice și ale testelor acomodative, subliniind rolul cicloplegiei în stabilirea unui diagnostic și tratament corect.

**Rezultate.** La prezentarea inițială, refracția obiectivă a arătat o miopie de -5,0 D. Examinarea fundului de ochi a evidențiat reflexe retiniene anormale, ceea ce a impus internarea pacientului pentru investigații suplimentare. Peste o săptămână, sub tratament cu cicloplegice și terapie vizuală, refracția manifestă a indicat +2,0 D, confirmând diagnosticul. Acuitatea vizuală s-a restabilit complet, demonstrând eficiența tratamentului aplicat.

**Concluzii.** Spasmul acomodativ reprezintă o tulburare a acomodării care necesită vigilență din partea oftalmologului. Cicloplegia și testele acomodative sunt esențiale pentru stabilirea diagnosticului cert.