

SUSPECȚIE CARCINOM SCUAMOS CONJUCTIVAL. CAZ CLINIC

Vlada Garștea¹, Paduca Ala¹

¹*Secția oftalmologie, IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, Chișinău, Republica Moldova*

²*Catedra de oftalmologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova*

Introducere: Carcinomul scuamos conjunctival este o formă de cancer a suprafeței ochiului, care apare ca o leziune albicioasă sau galben-rozalie. Este cel mai frecvent cancer al conjunctivei și este cauzat de o creștere anormală a celulelor epiteliale scuamoase, asociată cu factori precum expunerea excesivă la soare (radiații UV) și infecția cu papilomavirus uman (HPV).

Scopul lucrării: Prezentarea unui caz clinic al unui pacient cu suspecție la carcinom scuamos conjunctival, cu prezentarea diagnosticului diferențial și evidențierea importanței biopsiei pentru stabilirea diagnosticului final.

Materiale și metode: Anamneza, datele clinice și paraclinice au fost colectate din fișa de observație clinică. Explorările au inclus: examinarea oftalmologică completă și biopsia conjunctivei.

Rezultate: Pacientul X s-a prezentat de urgență la SCR, Secția Oftalmologie cu următoarele acuze: durere și disconfort la OS. Din spusele pacientului de aproximativ 2 ani a observat apariția unei formațiuni la nivelul conjunctivei la OS, iar acuzele sus-numite au apărut în urmă cu aproximativ 6 luni. A fost recomandată efectuarea biopsiei conjunctivei pentru stabilirea diagnosticului.

Concluzie: Suspiciunea de carcinom scuamos conjunctival necesită o evaluare atentă și un diagnostic diferențial riguros. Biopsia este esențială pentru confirmarea diagnosticului și orientarea tratamentului corect, asigurând un prognostic favorabil și conservarea funcției oculare.