

CARCINOM BAZOCELULAR ȘI PEMFIGUS VULGAR: CAZ COMPLICAT SUB CORTICOTERAPIE

Mihaela Rotari¹, Valeriu David¹, Lilian Șaptefrați¹

Conducător științific: Mircea Bețiu²

¹Catedra de histologie, citologie și embriologie, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

²Catedra de dermatovenerologie, Facultatea de Medicină nr.2, USMF, Republica Moldova

Introducere. Tumorile cutanate, benigne sau maligne, sunt frecvente la pacienții vârstnici și necesită evaluare clinică și histologică minuțioasă. În anumite cazuri, acestea pot coexista sau pot fi urmate de afecțiuni autoimune severe, cu potențial evolutiv grav și prognostic rezervat. **Scop.** Prezentarea unui caz cu tumori cutanate multiple și debut ulterior de pemfigus vulgar, subliniind necesitatea abordării integrate și a monitorizării constante în patologia cutanată la vârstnici. **Material și metode.** Datele au fost obținute retrospectiv din fișa medicală a unui pacient de 71 de ani și au inclus informații clinice, histopatologice și citologice. Investigațiile au cuprins examinări dermatologice și oncologice, biopsii cutanate și analiza citologică a bulelor. Evoluția sub tratament și complicațiile au fost documentate și corelate. **Rezultate.** În decembrie 2021 s-au excizat formațiuni retroauriculare, diagnosticate histologic ca nev nevocelular pigmentat. În iunie 2024 s-a înlăturat o placă ulcerată de pe nas, confirmându-se carcinom bazocelular superficial, cu hiperplazie sebacee. În august 2024 au apărut leziuni buloase pe față, scalp și torace, acoperite de cruste. Histologic s-a stabilit diagnosticul de pemfigus vulgar, cu 8–10 celule acantolitice/câmp și eozinofile în bule – 15%. S-a inițiat tratament sistemic cu glucocorticoizi și hydroxyclochină 400 mg/zi, cu răspuns lent. În septembrie, pacientul a dezvoltat cardiopatie ischemică și a decedat. **Concluzii.** Pacienții vârstnici cu antecedente de tumori cutanate necesită o supraveghere continuă, întrucât pot dezvolta patologii autoimune severe, cu evoluție imprevizibilă. Tratamentul eficient trebuie adaptat la statusul biologic și comorbiditățile existente pentru a reduce riscul de complicații fatale. **Cuvinte-cheie:** tumori cutanate, carcinom bazocelular, pemfigus vulgar.

BASAL CELL CARCINOMA AND PEMPHIGUS VULGARIS: A COMPLICATED CASE UNDER CORTICOSTEROID THERAPY

Mihaela Rotari¹, Valeriu David¹, Lilian Șaptefrați¹

Scientific adviser: Mircea Bețiu²

¹Department of Histology, Cytology and Embryology, *Nicolae Testemițanu* University, Chișinău, Republic of Moldova

²Department of Dermatovenerology, *Nicolae Testemițanu* University, Chișinău, Republic of Moldova

Introduction. Cutaneous tumors, whether benign or malignant, are common in elderly patients and require thorough clinical and histological assessment. In certain cases, they may coexist with or be followed by severe autoimmune disorders, which carry a serious course and guarded prognosis. **Objective.** Presentation of a case with multiple skin tumors and subsequent pemphigus vulgaris, emphasizing the importance of integrated management and continuous monitoring in skin diseases in the elderly. **Material and methods.** Data were obtained retrospectively from the medical records of a 71-year-old patient and included clinical, histopathological, and cytological information. Investigations included dermatological and oncological exams, skin biopsies, and cytological analysis of blisters. The evolution under treatment and complications were documented and correlated. **Results.** In December 2021, retroauricular lesions were excised and histologically diagnosed as pigmented nevocellular nevus. In June 2024, an ulcerated plaque was removed from the nose, confirming superficial basal cell carcinoma with sebaceous hyperplasia. In August 2024, bullous lesions appeared on the face, scalp, and trunk, covered by crusts. Histological examination confirmed pemphigus vulgaris with 8–10 acantholytic cells per field and 15% eosinophils in the blisters. Systemic treatment with glucocorticoids and hydroxychloroquine 400 mg/day was initiated, with a slow response. In September, the patient developed ischemic heart disease and died. **Conclusion.** Elderly patients with a history of skin tumors require close and regular monitoring, as they may develop severe autoimmune diseases with unpredictable evolution. Effective treatment must be tailored to the biological status and existing comorbidities to reduce the risk of fatal complications. **Keywords:** skin tumors, basal cell carcinoma, pemphigus vulgaris.