

UN CAZ NEOBIȘNUIT DE SUICID ÎN PRACTICA MEDICO-LEGALĂ

Daniela Postica¹, Andrei Tertîșnii²

Conducător științific: Andrei Pădure¹

¹Catedra de medicină legală, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

²Centrul de Medicina Legală, Chișinău, Republica Moldova

Introducere. Plăgile penetrante multiple în cavitățile anatomice ale corpului nu sunt specifice pentru autoagresiune datorită pragului redus de percepție la stimulii dureroși. Pentru a elucida condițiile în care fenomenul devine posibil e necesar de a analiza rezultatele obținute în cadrul cercetărilor multidisciplinare. **Scop.** Prezentarea unui caz anomic de moarte violentă prin sinucidere care a avut loc ca urmare a creșterii pragului de percepție la stimulii dureroși prin administrarea de substanțe psihoactive. **Material și metode.** Studiul a avut la bază analiza rezultatelor cercetării medico-legale ale cadavrului la fața locului, datelor necropsiei medico-legale a cadavrului, investigațiilor medico-legale complementare de laborator și literaturii medicale privind tematica abordată, inclusiv ale investigațiilor de anchetă ale organului de urmărire penală. **Rezultate.** Un bărbat a fost depistat mort în locuința sa cu multiple plăgi. La fața locului s-au găsit pete de sânge cu diferită morfologie - picături, prelingeri, băltoace și amprente, suprapunându-se. La necropsie au fost depistate plăgi tăiate la nivelul gâtului și plăgi înțepat-tăiate pe torace, precum și plăgi înțepat-tăiate penetrante la nivelul abdomenului cu eviscerarea intestinului. Decesul a survenit în rezultatul hemoragiei masive. În urma examenelor complementare s-a confirmat vitalitatea leziunilor și prezența metamphetaminei, amfetaminei și cocainei în probele prelevate. În cadrul anchetei s-a stabilit că victima s-a aflat singură în casă. **Concluzii.** Cocktailul de substanțe psihoactive a crescut substanțial pragul de percepție a stimulilor dureroși. Deși, din punctul de vedere al numărului și caracterului morfologic, plăgile depistate nu erau caracteristice suicidului, consumul de narcotice explică apariția lor ca rezultat al propriilor acțiuni. **Cuvinte-cheie:** sinucidere, necropsie, efectul anestezic al drogurilor.

UNCOMMON CASE OF SUICIDE IN FORENSIC MEDICINE PRACTICE

Daniela Postica¹, Andrei Tertîșnii²

Scientific adviser: Andrei Pădure¹

¹Department of Forensic Medicine, Nicolae Testemițanu University, Chișinău, Republic of Moldova

²Forensic Medicine Center, Chișinău, Republic of Moldova

Introduction. Multiple cavity-penetrating wounds are not specific for self-harming due to threshold of perception of pain stimuli. For the purpose of elucidating all the conditions under which the phenomenon becomes possible, it is necessary to analyze the results obtained in multidisciplinary research. **Objective.** Presentation of an anomic case of violent death by suicide that occurred as a result of an increase in the threshold of perception to painful stimuli by psychoactive substances. **Material and methods.** The study was based on the analysis of the consequences of the forensic medical examination of the cadaver at the crime scene, the forensic medical necropsy of the cadaver, the forensic medical laboratory investigations and the medical literature on the subject matter, including the investigations of the prosecution body. **Results.** A man was found dead in his house with multiple stab wounds. Bloodstains with different morphology - drops, drips, puddles, puddles and fingerprints - were found at the scene, overlapping. Necropsy revealed cut wounds on the neck and stab wounds on the chest, as well as penetrating stab wounds to the abdomen with evisceration of the intestine. His death occurred as a result of massive hemorrhage. Complementary examinations confirmed the vitality of the injuries and the presence of methamphetamine, amphetamine and cocaine in the samples collected. The investigation established that the victim was alone in the house. **Conclusion.** The cocktail of psychoactive substances substantially increased the threshold of perception of painful stimuli. Although, in terms of number and morphology, the wounds detected were not characteristic of suicide, the use of narcotics explains their appearance as a result of self-harming. **Keywords:** suicide, necropsy, anesthetic effect of the substances.