

RINOFIMA. DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT, CAZ CLINIC**Ana-Maria Mucuța, Dumitru Sîrbu, Nicolae Chele, Ion Dabija, Maxim Gorea, Daniel Sîrbu**

Conducător științific: Dumitru Sîrbu

Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

Introducere. Rinofima o formă avansată de rozacee, caracterizată prin hipertrofia progresivă a glandelor sebacee și fibroză la nivelul nasului. Se manifestă prin deformări inestetice deformante. Deși benignă, rinofima necesită tratament chirurgical în formele avansate pentru restabilirea funcției și a aspectului estetic. **Scop.** Determinarea și evidențierea particularităților de diagnostic, conduită și tratament, evoluție și îngrijire postoperatorie a plăgii prin vindecarea per-secundam în cazul rinofimei. **Material și metode.** Pacient A./D., gen masculin, 67 de ani, s-a adresat la IMU, cu aspectul inestetic progresiv al nasului. Clinic s-a evidențiat o hipertrofie difuză a tegumentului nazal cu aspect nodular, roșeață și pori dilatați. S-a optat pentru tratamentul chirurgical prin rezecție parțială a formațiunii, urmată de remodelare tisulară. **Rezultate.** S-a inițiat intervenția chirurgicală de rezecție a țesutului fibrozant, prin excizia cu bisturiul și remodelarea cu diatermocoagulatorul și deramabrazie, utilizând freză din zirconiu. Plaga postoperatorie a fost menajată prin pansamente zilnice și utilizarea membranelor de collagen. Intervenția s-a desfășurat fără de complicații intraoperatorii și postoperatorii imediate. Evoluția locală a fost favorabilă, cu epitelizarea per secundam și restabilirea conturului nazal într-un mod fiziologic și estetic. La control repetat peste 3 luni postoperator, rezultatul a fost considerat stabil și estetic din punct de vedere clinic și chirurgical. **Concluzii.** Tratamentul chirurgical al rinofimei reprezintă soluția optimă în formele avansate cu deformare estetică severă. Abordarea corectă, instrumentarul adecvat și îngrijirea postoperatorie contribuie decisiv la succesul tratamentului și la reintegrarea socială a pacientului. **Cuvinte-cheie:** rinofima, fibroza, conduită chirurgicală, epitelizare.

RHINOPHYMA. DIAGNOSIS AND TREATMENT, A CLINICAL CASE**Ana-Maria Mucuța, Dumitru Sîrbu, Nicolae Chele, Ion Dabija, Maxim Gorea, Daniel Sîrbu**

Scientific adviser: Dumitru Sîrbu

Arsenie Guțan Department of Oral-Maxillofacial Surgery and Oral Implantology, Nicolae Testemițanu University, Chișinău, Republic of Moldova

Introduction. Rhinophyma - advanced form of rosacea, characterized by progressive hypertrophy of the sebaceous glands and fibrosis of the nasal tissue. It manifests as disfiguring and unaesthetic nasal deformities. Being benign, requires surgical treatment in advanced stages to restore function and aesthetic appearance. **Objective.** Determination and highlighting of the diagnostic, management, and treatment particularities, as well as the postoperative wound care and healing by second intention in a case of rhinophyma. **Material and methods.** Patient A./D., male, 67 years old, presented to IMU with progressive unaesthetic nasal enlargement. Clinical examination revealed diffuse hypertrophy of the nasal skin with a nodular appearance, redness, and enlarged pores. Surgical treatment was chosen, consisting of partial resection of the lesion followed by tissue remodeling. **Results.** The surgical intervention for resection of fibrotic tissue was initiated by scalpel excision, followed by remodeling using a diathermy device and dermabrasion with a zirconium bur. The postoperative wound was managed with daily dressings and collagen membrane application. The procedure was completed without intraoperative or immediate postoperative complications. Local evolution was favorable, with second-intention epithelialization and restoration of the nasal contour in a physiologic and aesthetic manner. At the 3-month postoperative follow-up, the outcome was considered stable and aesthetically from clinical and surgical perspectives. **Conclusion.** Surgical treatment remains the optimal solution in advanced cases of rhinophyma with severe aesthetic deformation. Proper surgical planning, instrumentation, and meticulous postoperative care are essential for achieving therapeutic success and facilitating the patient's social reintegration. **Keywords:** rhinophyma, fibrosis, surgical management, re-epithelialization.