

MEDIASTINITA ANTERIOARĂ DUPĂ OPERAȚII PE CORD DESCHEZIS

MEDIASTINITIS AFTER OPEN HEART SURGERY

Prisacaru I., Nigolean A., Moscalu V., Ureche A., Manolachi G., Turcanu G., Barnaciuc S., Morozan V., Onica E., Batrînac A.

IMSP Spitalul Clinic Republican

Rezumat

Scopul lucrării: Mediastinita anteroioara după operații pe cord este asociată cu o rată sporită a morbidității, care duce la mărirea costului mediu de spitalizare a acestui contingent de pacienți. Scopul acestui studiu a fost de a determina predictorii anteriori de dezvoltare a mediastinitiei pre-, intra-, și postoperatorie.

Metode: În perioada anilor 2000 – 2012, în Centrul de Chirurgie cardiacă au suportat intervenție chirurgicală pe cord 3134 pacienți, dintre care la 46 (1,46%) de pacienți evoluția postoperatorie s-a complicat cu clinică de mediastinită 23 (0,73%) și infectarea plăgii postoperatorii cu sau fără dehiscență sternului 23 (0,73%).

Grupul de pacienți a fost constituit din 31 (67,3%) bărbați și 15 (32,7%) femei, cu vârstă medie de 59 de ani. Preoperatoriu 21 (45%) din ei erau obezi, 8 (17%) aveau diabet zaharat, 31 (67%) bronșită cronică obstructivă.

Pentru By-pass aortocoronarian s-a folosit artera toracică internă unilateral (ATI) 21(45%) și ATI bilaterală la 2(4%) pacienți. Timpul intervenției chirurgicale a constituit, în mediu 345min. Transfuzii masive postoperatorie au necesitat doar la 6(13%) pacienți. Diagnosticul de mediastinită a fost stabilit la 5-17 zi postoperatoriu. Restabilirea integrității sternale cu aplicarea procedeului Robicsek s-a efectuat la 14(30%) pacienți.

Decesul a fost înregistrat la un pacient 1(2,1%) la 20 zi postoperator cauzat de mediastinită seropurulentă și de insuficiență poliorganică. La 4 pacienți s-a dezvoltat osteomielită sternală, care a necesitat tratament de lungă durată (3-6 luni).

Concluzia: Studiul sugerează că ATI uni sau bilaterale, bronhopneumonia cronică obstructivă, Diabetul zaharat, obezitatea, transfuziile masive, timpul îndelungat a operației sunt predicatori importanți de mediastinită.

Summary

Background: Mediastinitis is a serious complication of cardiac surgery. It has a significant socioeconomic impact and high morbidity. The purpose of this study was to determine pre-, intra-, and postoperative predictors of mediastinitis.

Methods and results: From 3134 consecutive patients, which underwent cardiac surgery in 2000-2012, forty-six patients (1.46%) developed postoperator mediastinitis 23 (0.73%) and postoperator wound infection with or without dehiscence of the sternum 23 (0.73%). In This group of patients 31 were men (67,3%) and 15 women (32,7%) of average age 59 years. Preoperative 21 (45%) of them were obes, 8 (17%) suffered of diabetes mellitus and 31 (67%) of chronic obstructive pulmonary disease.

As a Coronary Artery Bypass Graft in 21(45%) was used unilateral IMA, and in 2(4%) cases BIMA. The average duration of surgery was 345min. Massive transfusion after surgery was needed on six patients (13%). Diagnosis of Mediastenitis was established at the 5 - 17 days postoperatively. Restoration of sternal integrity with the Robicsek proceeding was performed in 14 (30%) patients.

One patients dead at the 20th day after surgery due to mediastenitis and failure Multiple Organ System Dysfunctions. Four patients developed sternal osteomyelitis, requiring long-term treatment (3-6 months)

Conclusion: The present study suggest that uni/bilateral internal mammary artery grafting, chronic obstructive pulmonary disease, obesity, transfused units and long surgery duration are important predictors of mediastinitis.

Introducere

In 1897 chirurgul H. Milton, a descris pentru prima dată sternotomia mediană(1).

El a fost, cel care a promovat utilizarea acestei proceduri pentru intervențiile chirurgicale a mediastinului.

Onoarea însă ea revenit lui Julian, care a efectuat prima sternotomie în 1956. Această cale de acces este și în prezent abordul de preferință în Chirurgia Cardiacă. (2)

Până în prezent aproape un secol mai târziu după descrierea mediastinitiei, rămâne a fi o complicație infecțioasă gravă în urma sternotomiei mediane, cu o rată a morbidității cuprinsă între 0,25% până la 2,5%, și o mortalitate crescută, după unii autori variind de la 12,5% la 47%. (3,4,5).

Prevenirea complicațiilor este una dintre cele mai importante aspecte de gestionare a pacienților care au suportat intervenție pe cord. Conform APIC (Guide 2008, Washington, USA), măsurile de prevenire ale Mediastinitiei în cadrul intervențiilor chirurgicale pe cord cu sternotomie (Guide for Prevention of Mediastinitis Surgical Site Infections Following Cardiac Surgery) sunt următoarele :

1. Igiena strictă a mîinilor personalului medical ;
2. Antibioprofilaxie (independenta de procedeul chirurgical și de potențialul de patogenitate al florei microbiene) ;
3. Controlul Glicemiei (hiperglicemia fiind un factor de risc pentru dezvoltarea mediastinitiei) ;
4. Îndepărarea pilozității din regiunea sternală prin tun-

- dere și nu prin razaj, deoarece acesta din urma provoacă microleziuni cutanate, cu colonizarea ulterioară de către microflora cutanată (*Staphylococcus Epidermidis*) ;
5. Antisepsia preoperatorie a pielii (spălarea cu săpun antimicrobian) , și baie cu soluție de Gluconat de Clorhexidina ;
 6. Tehnici chirurgicale de Asepsie ;
 7. Îmbrăcământea Post-operatorie pentru pacienți să fie permeabilă pentru schimbul de gaze, să mențină temperatura corpului în jurul de 37 °C, și să prevină permeabilitatea pentru sursele de contaminare cu Microorganisme ;
 8. Decolonizare nazala (*Staphylococcus aureus* fiind depistat în 25% - 35%).

Diagnosticul precoce și tratamentul medico-chirurgical de urgență al mediastenitei poate împiedica răspândirea infecției cu sechete sale devastatoare. (6,7)

Identificarea Factorilor de Risc

S-au identificat mai mulți factori ce ar favoriza dezvoltarea mediastenitei anterioare. Infectarea plăgii postoperatorii, diabet zaharat, obezitatea, folosirea IMA bilateral pentru bypass coronarian. Ca exemplu preconizarea la un pacient cu diabet zaharat a unei intervenții chirurgicale pentru bypass coronarian cu folosirea IMA bilateral crește riscul apariției mediastinităi anterioară cu 5 %, după un studiu efectuat de Ottino s. a. (8,9,10,11,12,13)

Stabilirea Factorilor de risc

În studiul făcut de Clevel and clinics în deosebi la pacienții după CABG cu graft unic IMA, au ajuns la concluzia că factorii predispozanți sunt:

1. Obezitatea (pacienți la care greutatea corporală este mai mare decât 20 % din masa normală).
2. IMA bilateral + Diabet Zaharat.
3. Bronșita cronică obstructivă ;
4. Timpul îndelungat a intervenției chirurgicale.
5. Necessitatea de transfuzie de sânge chiar în primele ore postoperatorii.
6. Esecuri chirurgicale (sternotomy asimetrică, aplicarea incorectă a suturilor metalice). (14)

Folosirea bilaterală a IMA(**Internal Mammary Arteries**) în bypass aortocoronarian. IMA – este considerată ca conduită cel mai ideal în bypass aortocoronarian deoarece anastomoza cu LAD semnificativ ridică longivitata pacientului fiindcă termenul lung de patentă a graftului IMA în 90% depășește 10 ani, pe când vena doar 60%. (17) Datorită acestui fapt unii chirurgi folosesc ambele IMA pentru bypass aortocoronarian, fiindcă în unele centre cardiochirurgicale aceasta nu este alt ceva decât o rutină. (17,18,19).

Rezultatul apariției mediastinităi după bypass aortocoronarian cu IMA bilateral este o problemă controversată. Se cunosc trei studii (20-22) care au identificat riscul apariției infectării plăgii postoperatorii care cu timpul va duce la mediastinită, de aceea nu e de mirat ca consolidarea marginilor sternale va fi îndelungată deoarece fiecare hemistern își pierde 90% din vascularizarea (23,24) .

Ischemia sternală după mobilizarea uneia sau două IMA a fost bine documentată în studiul făcut de Carrier și colaboratorii (25), monitorizând tomografic la o săptămână și la 4 săptămâni după sternotomy mediană. La o săptămână s-a observat o ischemie sternală observată mai semnificativ la

paciенți cu folosirea grefei IMA bilaterală. Aceste dereglaři regreseză după o lună de la intervenția chirurgicală, probabil dezvoltării în acest timp a colateralelor

Cresterea incidenței infectării plăgii s-a observat la folosirea grefei IMA bilaterală este cauza a mai multor factori predispozanți ca: timpul operațional de lungă durată, folosirea diatermiei pentru hemostază, reoperăriile cauzate de hemoragie postoperatorii, riscul complicațiilor pulmonare postoperatorii cauzată de pleurotomia uni sau bilaterale. De aceea mai multe surse sugerează că folosirea grefei bilaterale IMA nu poate fi un factor independent de risc pentru infectarea plăgii. (15-29)

Alți factori de risc

- a) Fumătorii la care riscul de apariție a infectiilor pulmonare postoperatorii este crescut (prin modificarea florei cavității bucale).
- b) răspunsul imun scăzut, și malnutriția;
- c) intervalul crescut între timpul de spitalizare și momentul intervenției chirurgicale;
- d) durata intervenției chirurgicale (mai mult de 5 ore), conform studiului făcut de Braxton s.a.;
- e) timpul de utilizare al CEC și clampinga îndelungată a Aortei;
- f) chirurgia de urgență (conform lui Lowy și Becker);
- g) Prevalenta mediastenitei la bărbați (B/F = 6/1, conform studiului efectuat de Becker s.a.), ce se explică prin predominarea pilozitatii și a stratului muscular mai bine dezvoltat la nivelul peretelui toracic, care ar fi responsabil de crearea unei forte de tensiune cutanate mai importante, provocând ulterior un defect de cicatrizare, și un risc de colonizare cu microflora cutanată;
- c) pierderea și transfuzia excesivă de sânge postoperatorie, perforația mănușilor în timpul intervenției chirurgicale (37), resternotomy, vârstă mai mare de 70 ani sunt, de asemenea, factori de risc pentru infectarea plăgii sternale.

Infecția și patogenia mediastinităi poststernotomice

Pacienții supuși intervenției pe cord sunt expuși unui risc de a dobândi infecții din cauza insuficienței răspunsului imun scăzut și din cauza numărului crescut de porturi de intrare a germenilor patogeni bacterieni [30]. Conform unui studiu recent efectuat în Franța, de către POLE SANTE SECURITE SOINS du Médiateur de la République, sunt evocate 3 moduri de contaminare în cadrul Mediastinităi:

- origine multifactorială (într-un mediu bogat în germeni);
- perturbarea echilibrului fragil între pacient (gazda) și germeni (statutul imun precar);
- teoria de inoculare bacteriana (infecta se declanșează începând cu un anumit număr de germeni pe un gram de țesut).

Bacterii gram-pozitive sunt organisme cel mai frecvent izolate în mediastinită, *Staphylococcus aureus* sau *S. epidermidis* sunt identificate în 70% la 80% din cazuri [31,32]. Infecțiile mixte sunt responsabile de până la 40% din cazuri [33]. Microorganismele gram-negativ și infecțiile fungice sunt rareori incriminate ca principala cauză a mediastenitei [34].

Infecția plăgii după sternotomy mediană se începe cu o zonă localizată ale osteomielitei sternale cu minim de semne exterioare [31, 34]. Apoi infiltrarea de bacterii în straturile mai profunde, este evenimentul cheie în dezvoltarea unei infecții

mediastinale (9). O altă ipoteză pentru patogeneza mediastinului este drenajul inadecvat a mediastinului, ducând la o mare colecție retrosternală acționând ca un mediu de cultură pentru dezvoltarea bacteriilor.

La apariția mediastinităi, dacă măsurile de tratament nu sunt luate la timp, se dezvoltă complicațiile ulterioare (cum ar fi osteomielită, insuficiență respiratorie, sepsis, sau insuficiență poliorganică) și, în rezultatul căreia, pacientul poate deceda. Astfel de consecințe complete sunt posibile chiar și atunci când sunt efectuate operațiile radicale ca îndepărțarea sternului și utilizarea a fâșii de țesut muscular, pentru a obține consolidarea toracică. Probabilitatea de supraviețuire a pacienților cu complicații septice este limitată (9, 30-34).

Acest raport implică o serie consecutivă de pacienți, care au fost operați în secția Vicii Cardiace Dobândite. Toți pacienții au fost tratați cu același protocol, fără excepții, indiferent de timpul apariției mediastinităi.

Metode

În perioada anilor 2000 – 2012, în Centrul de Chirurgie cardiaca au suportat intervenție chirurgicală pe cord 3134 pacienți, dintre care la 46 (1,46%) de pacienți evoluția postoperatorie s-a complicat cu clinică de mediastinită 23 (0,73%) și infectarea plăgii postoperatorii cu sau fără dehiscentă sternului 23 (0,73%).

Grupul de pacienți a fost constituit din 31 (67,3%) bărbați și 15 (32,7%) femei, cu vîrstă medie de 59 de ani. Preoperator 21 (45%) din ei erau obezi, 8 (17%) aveau diabet zaharat, 31 (67%) bronștită cronică obstructivă.

Pentru By-pass aortocoronarian s-a folosit artera toracică internă unilateral (ATI) 21 (45%) și ATI bilateral la 2 (4%) pacient. Timpul intervenției chirurgicale a constituit, în mediu 345 min. Transfuzii massive postoperatorie au necesitat doar la 6 (13%) pacienți. Diagnosticul de mediastinită a fost stabilit la 5-17 zi postoperator. Restabilirea integrității sternale cu aplicarea procedeului Robicsek s-a efectuat la 14 (30%) pacienți.

Decesul a fost înregistrat la un pacient 1 (2,1%) la 20 zi postoperator sau cauzat de mediastinită seropurulentă și de insuficiență poliorganică. La 4 pacienți s-a dezvoltat osteomielită sternală, care a necesitat tratament de lungă durată (3-6 luni).

Diagnosticul de infectare a plăgii a fost stabilit la prezența eliminărilor sero-purulente din plaga. Colectarea materialului pentru analiza bacteriologică a fost condiție obligatorie în toate cazurile.

Tabelul 1

Caracteristica pacienților operați

Operati	No.
Bypass aortocoronarian	14
Protezarea VMtrale + anuloplastia Vtricuspid	11
Protezarea Valvei Aortale	5
Corecție trivalvulară	5
Bypass coronarian + Corecție trivalvulară	6
Bypass aortocoronarian + Plastia Anevrism VS Jatane-Dor + a/pl VMTr	3
Redresarea a. coronare stingi din AP in Ao procedeu Takeuchi	1
Timomectomie	1

Tabelul 2

Organismele cele mai frecvente de cultură sunt prezente

Organism	No.
Stafilococ epidermitis	20
Stafilococcus saprofiticus	2
Corynebacterium	1
Str. Veridans	1
E.aerogenes	2
Flora mixta	10
Bacili gram negativi	2
Creștere de cultura nu se atesta	8

Îngrijirea Postoperatorie

Pacienții sunt extubati după intervenția chirurgicală pe masa de operație (ca excepție, unei pacienți sunt ventilați un timp mai îndelungat). Alimentarea orală este reluată. Plaga se irigă în continuu cu 100-150 ml pe oră timp de 7 zile.

Tuburile sunt permanente la aspirație activă. Pentru irigare s-a folosit soluție cu antibiotice (de obicei, la 3000 ml de soluție salină 3 g de cefazolină sau 20 ml soluție Betadină 10%). Singurul dezavantaj al acestui sistem de irigare este disconfortul pe care îl suportă pacientul fiindcă obligatoriu imobilizare la pat timp de 3 zile cu micșorarea maximală a amplitudei mișcărilor membrelor superioare și se recomandă folosirea bandajului toracic. Pentru prevenirea tromboembolismului pulmonar s-a folosit Fraxiparin 0.6 ml s/c de 2 ori pe zi sau heparină nefracționată (5000 UI de 3 ori s/c) sub controlul APTT timp de 5 zile.

În cazul când, după 48 de ore, întoarcerea pe drenaj se determină lichid limpede, cu nici un material fibrinos sau cheaguri, rata de irigare poate fi scăzută la 50-75 ml pe oră până la sfârșitul săptămânii de tratament. După aceasta, irigarea este întreruptă dar se menține aspirația activă. Din acest moment, pacienții nu necesită imobilizarea la pat.

Pentru a proteja stabilitatea sternului, pacienții li se permit numai extinderea brațelor anterioare.

După 7-8 zile postoperator tuburile de aspirație sunt trase în afara plăgii cu 2-3 cm în fiecare zi, până când toate tuburile sunt scoase în afara (de obicei această procedură cuprinde nu mai mult de 5-7 zile).

Pacienții continuă tratamentul antibacterian intravenos. În grupul nostru de pacienți infectia a fost cauzată de Staphylococcus epidermidis (43%), antibiotic de electie era cefaperazonul cu sulbactam 2,0 g de 2 ori zilnic. La necesitate, în cazurile când este rezistență la cefalosporine, a fost folosită vancomicina și gentamicina. La pacienți, care au avut infecții gram-negative sau mixte, s-a indicat Amikacină 0,5, dizolvată la 200 ml soluție izotonica de 2 ori i.v. Indiferent de antibiotice care au fost alese, tratamentul a fost prelungit până la 2 săptămâni în spital și o săptamana la externare.

Îngrijirea plăgii postoperatorii: de două ori pe zi, incizia pielii este prelucrată cu Betadină. La 7-8 zi postoperator rana este prelucrată cu verde de briliant. Suturile de închidere a pielii ar trebui să rămână pentru un total de 15-20 zile.

Rata de vindecare a fost de 93% cu afarea în spital de 16 zile (interval de 20-30 zile), cu doar un deces la 20 zi postoperator sau cauzat de insuficiență poliorganică, mediastinită seropurulentă. La 4 pacienți s-a dezvoltat osteomielită sternală, care a necesitat tratament de lungă durată (3-6 luni).

Pacienții care au fost menționați, diagnosticul de osteomielita sternală a fost stabilit în spital raional, la 49 și 56 zile postoperator și au fost reinternați în secția Cardiochirurgie pentru reoperare.

La toți sa determinat osteomielită cu fistule purulente la doi dintre ei era și afectarea cartilajelor costale. Operațiile au fost efectuate conform protocolului stabilit inclusiv înlăturarea cartilajelor rebordului costal din cauza progresării osteomielitei. Vindecarea totală am obținut la doi pacienți. Alții doi au necesitat intervenții chirurgicale repetitive, cu tratament ambulatoriu de lungă durată.

Pacienți operați n-au avut complicații trombembolice, prin urmare, utilizarea fraxiparnei și heparinei pare a fi eficientă pentru a preveni acesta complicație.

Nu s-au observat complicații pulmonare. Dimpotrivă, unii dintre pacienții, care au suferit de insuficiență respiratorie pre-operator, în timp ce sternul a fost instabil, a avut o îmbunătățire semnificativă din momentul în care a fost stabilizat sternul.

Pacienții, care au nevoie de tratament cu anticoagulanți, au reluat warfarina sau trombostop a doua zi după intervenția chirurgicală. Protocolul dacă se respectă cu strictețe, duce la o recuperare totală.

Concluzii

Mediastinita rămâne a fi o complicație rară, dar serioasă în urma intervențiilor chirurgicale pe cord deschis cu sterno-

tomicie mediana, cu o morbiditate și mortalitate semnificativa. Impactul socio-economic al acestei complicații este destul de important, iar costul mediu de spitalizarea a pacienților cu infecția plăgii este de trei ori mai mare decât la pacienți cu un curs fără complicații post-operatorie(35). Acest supracost este în primul rând din cauza morbidității mari, inclusiv sedere prelungită în spital, precum și necesitatea de a repetat proceduri chirurgicale la acești pacienți.

În momentul de reintervenție, luând în considerație adeziunile retrosternale, mobilizarea sternului se efectuează cu precauție. Timpul mediu pentru unul dintre aceste reoperări este de 2 ore. Operațiile repetitive pe stern sunt dificile și pot fi efectuate doar de chirurgi experimentați. În concluzie putem stabili, ca Mediastinita este cauzata multifactorial, iar cei mai importanți factori predictori implicați în dezvoltarea Mediastinităi pot fi diferiti în dependență de diferite centre cardiochirurgicale. De aceea, pentru stabilirea unor rezultate cu o importanță statistică mai importantă ar fi necesar un studiu cu implicarea mai multor centre de cardiochirurgie.

In cazul nostru, studiul sugerează că ATI uni sau bilaterale, bronhopneumonia cronică obstructivă, diabetul zaharat, obezitatea, transfuziile masive, timpul îndelungat a operației sunt predicatori importanți de mediastinită.

Bibliografie

- Milton H. Mediastinal surgery. Lancet 1897;1:872-5
- Coelho HM, Dye WS, Grove WJ, Julian OC, Sadove MS. « Hypothermia in open heart surgery ». AMA Arch Surg. 1956 ;73(3):493-502.)
- Lepelletier D, Perron S, Bizouarn P, Caillon J, Dmgeon H, Michaud JL, et al Surgical-site infection after cardiac surgery: incidence, microbiology, and risk factors Infect Control Hosp Epidemiol 2005;26:460-72.
- Braxton JH, Marrin CA, McGrath PD, Morton JR, Norotsky M, Charlesworth DC, et al. 10-year follow-up of patients with and without mediastinals. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2004;16:70-6.
- Eklund AM, Lytykainen O, Klemets P, Huotari K, Anuria VJ, Werkkala KA, et al Mediastinitis after more than 10,000 cardiac surgical procedures. Ann Thorac Surg 2006;82:1784-9.
- Sanfelippo PM, Danielson GK. Complications associated with median sternotomy. J Thorac Cardiovasc Surg 1972;63:419-23.
- Ott DA, Cooley DA, Solis RT, Harrison CB III. Wound complications after median sternotomy: a study of 61 patients from a consecutive series of 9,279. Cardiovasc Dis (Full Tex Heart Inst) 1980;7:104-9.)
- Molina E. Primary closure for infected dehiscence of the sternum. Ann Thorac Surg 1993;55:459-63.
- Nelson RM, Dries DJ. The economic implications of infection in cardiac surgery. Ann Thorac Surg 1986;42:240-2.
- Serry C, Bleck PC, Javid H, et al. Sternal wound complications: management and results. J Thorac Cardiovasc Surg 1980;80:861-7.
- Grossi EA, Esposito R, Harris LJ, et al. Sternal wound infection and use of internal mammary artery grafts. J Thorac Cardiovasc Surg 1991;102:342-7.
- Pairolero PC, Arnold PC, Harris JB. Long-term results of pectoralis major muscle transposition for infected sternotomy wounds. Ann Surg 1991;213:583-90.
- Sanfelippo PM, Danielson GK. Complications associated with median sternotomy. J Thorac Cardiovasc Surg 1972;63:419-23.)
- Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, et al. Sternal wound complications after isolated coronary artery bypass grafting: early and late mortality, morbidity and cost of care. Ann Surg 1990;211:179-87)
- Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, et al. Influence of internal-mammary-artery graft on 10-year survival and other cardiac events. N Engl J Med 1986;314:1-6.
- Cameron A, Kemp HG, Green G. Bypass surgery with the internal mammary artery graft: 15 year follow-up. Circulation 1986;74(Suppl 3):30-6
- Kirklin JW, Akins CW, Blackstone EH, et al. Guidelines and indications for coronary artery bypass graft surgery. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on assessment of diagnostic and therapeutic cardiovascular procedures (subcommittee on coronary artery bypass graft surgery). J Am Coll Cardiol 1991;17:843-89Dion R, Etienne PY, Verhelst R, et al. Bilateral mammary grafting. Eur J Cardiothorac Surg 1993;7:287-94.
- Green GE, Cameron A, Goyal A, Wong S, Schwanede J. Five-year follow-up results of microsurgical multiple internal thoracic artery grafts. Ann Thorac Surg 1994;58:74-9.
- Fiore AC, Naunheim KS, Dean P, et al. Results of internal thoracic artery grafting over 15 years: single versus double grafts. Ann Thorac Surg 1990;49:202-9
- Hazelrigg SR, Wellons HA, Schneider JA, Kolm P. Wound complications after median sternotomy. J Thorac Cardiovasc Surg 1989;98:1096-9.
- Kouchoukos NT, Wareing TH, Murphy SF, Pelate C, Marshall WG Jr. Risks of bilateral internal mammary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 1990;49:210-9
- Cosgrove DM, Lytle BW, Loop FD, et al. Does bilateral internal mammary artery grafting increase surgical risk? J Thorac Cardiovasc Surg 1988;95:859-6.
- Seyfer AE, Shriner CD, Miller GM, Graeber GM. Sternal blood flow after median sternotomy and mobilization of the internal mammary arteries. Surgery 1988;104:899-904.
- Arnold M. The surgical anatomy of sternal blood supply. J Thorac Cardiovasc Surg 1972;64:596-610.
- Carrier M, Gregoire J, Tronc F, Cartier R, Leclerc Y, Pelletier LC. Effect of internal mammary artery dissection on sternal vascularization. Ann Thorac Surg 1992;53:115-9.
- Nishida H, Grooters PK, Merkley DF, Thieman KC, Soltanzadeh H. Post-operative mediastinitis: a comparison of two electrocautery techniques on presternal soft tissues. J Thorac Cardiovasc Surg 1990;99:969-76
- Burgess GE, Cooper JR, Marino RJ, Peuler MJ, Mills NL, Ochsner JL. Pulmonary effect of pleurotomy during and after coronary artery bypass with internal mammary artery versus saphenous vein grafts. J Thorac Cardiovasc Surg 1978;76:230-4.

27. Landymore RW, Howell F. Pulmonary complications following myocardial revascularization with the internal mammary artery graft. Eur J Cardiothorac Surg 1990;4:156–62.
28. Shapira N, Zabatino SM, Ahmed S, Murphy DMF, Sullivan D, Lemole GM. Determinants of pulmonary function in patients undergoing coronary artery bypass operations. Ann Thorac Surg 1992;50:268–73.
29. Bryan AJ, Lamarra M, Angelini G, West RR, Brekenridge IM. Median sternotomy wound dehiscence: a retrospective case control study of risk factors and outcome. J R Coll Surg Edinb 1992;37:305–8.
30. Grossi EA, Culliford AT, Krieger KH, et al. A survey of 77 major infectious complications of median sternotomy: a review of 7,949 consecutive operative procedures. Ann Thorac Surg 1985;40:214–23.
31. Demmy TL, Park SB, Liebler GA, et al. Recent experience with major sternal wound complications. Ann Thorac Surg 1990;49:458–62.
32. Sarr MG, Gott VL, Townsend TR. Mediastinal infection after cardiac surgery. Ann Thorac Surg 1984;38:415–26.
33. Trouillet JL, Vuagnat A, Combes A, Bors V, Chastre J, Gandjbakhch I, et al. Acute poststernotomy mediastinitis managed with debridement and closed-drainage aspiration: factors associated with death in the intensive care unit. J Thorac Cardiovasc Surg 2005;129:518–524.
34. Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, Mahfood S, McHenry MC, Goomastic M, Stewart RW, Golding LAR, Taylor PC. Sternal wound complications after isolated coronary artery bypass grafting: early and late mortality, morbidity and cost of care. Ann Thorac Surg 1990;49:179–87.
35. Sjogren J, Malmstro M, Gustafsson R, et al. Poststernotomy mediastinitis: a review of conventional surgical treatments, vacuumassisted closure therapy and presentation of the Lund University Hospital mediastinitis algorithm. Eur J Cardiothoracic Surg 2006;30:898–905.
36. Anne Eklund, (Academic Dissertation 2006), Mediastinitis After Cardiac Surgery. Huch, Jorvi Hospital Publications, Series A 01/2006, Department of Cardiothoracic surgery Helsinki University Central Hospital

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ СЕРДЕЧНЫХ АНОМАЛИЙ У БОЛЬНЫХ С КОАРКТАЦИЕЙ АОРТЫ

SURGICAL TREATMENT OF CONCOMITANT HEART ANOMALIES IN PATIENTS WITH AORTIC COARCTATION

Олег Репин, Ливиу Манюк, Василе Корча, Эдуард Кептанару, Оксана Малыга

Республиканская Клиническая Больница
Отделение Врожденных Пороков Сердца

Rezumat

Scopul lucrării: Studiu retrospectiv al experienței de mai mult de 20 ani (1991–2012) al unui singur centru în chirurgia coarctării de aorta (CA).

Rezultate: Două sute unsprezece pacienți au fost supuși intervenției pentru CA: 24 sugari, 173 copii și 38 adulți. Leziuni asociate au fost găsite în 152 (72%) de pacienți. S-au înregistrat 9 (4.3%) decese intraspitalicești. La urmărire de durata s-a înregistrat un deces cauzat de proceduri chirurgicale simultane.

Recoarctatia s-a dezvoltat la 12 supraviețuitori de durata din grupul pediatric (9.9%), proceduri chirurgicale simultane au fost executate în 46 cazuri. Trei adulți (1.4%) din supraviețuitorii de durată au fost operați pentru aneurizme ale anastomozelor.

Concluzie: 1. Frecvența anomalieiilor asociate cu CA este de aproximativ 72%. 2. Operațiile precoce în CA pot salva viața copiilor și preveni complicațiile la distanță. 3. Pacientii cu anomalii asociate necesită un monitoring sistematic din partea cardiologului și chirurgului cardiac pentru depistarea precoce și corijarea complicațiilor în curs de dezvoltare. CA în perioada adultă este uneori asociată cu patologii cardio-vasculare adiționale, care necesită intervenția.

Summary

Objective: A retrospective study to review the experience of a single center with surgery for aortic coarctation (AC) over a period of 20 years (1991–2012).

Results: Two hundred and eleven patients underwent surgery for AC: 24 infants, 173 children and 38 adults. Associated lesions were found in 152 (=72%) patients. There were 9 (4.3%) hospital deaths. During the follow-up there were one late death after simultaneous surgical procedures. Re-coarctation occurred in 12 late survivors of the pediatric group (9.9%), simultaneous surgical procedures were performed in 46 cases. Three adults (1.4%) late survivors were operated on for false aneurisms of anastomosis.

Conclusions: 1. The frequency of associated anomalies in AC is about 72%; 2. Early operations in case of CA can save the life of child and prevent the development of long-term complications; 3. Patients with associated anomalies must (have to) require regular monitoring by a cardiologist and cardiac surgeon for early detection and correction of developing complications. CA in the adulthood is sometimes associated with additional cardiovascular pathologies that require intervention.