



PROFILUL LIPIDIC AL PACIENȚILOR CU INFECȚIE CRONICĂ VIRALĂ B

Elena Chirvas, Iulianna Lupașco, Vlada-Tatiana Dumbrava, Natalia Taran, Gheorghe Harea, Inna Vengher
Laboratorul de gastroenterologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu",
Chișinău, Republica Moldova

Introducere

Conform studiului nostru preliminar, majoritatea bolnavilor cu infecție cronică virală B au fost supraponderali (37,5%) și obezi (33,3%), cei normoponderali constituind 29,16%, ceea ce face posibilă prezența dereglărilor în profilul lipidic al pacienților cu infecție cronică virală B.

Cuvinte-cheie

infecție cronică cu VHB, colesterol.

Scopul lucrării


Aprecierea nivelului colesterolului la pacienții cu infecție cronică cu virusul hepatitic B (VHB).

Material and metode

La 83 de persoane (p.) cu markeri hepatici virali negativi (lotul I) și la 72 p. cu infecție cronică cu VHB (lotul II), dintre care 56 p. cu forma serologică HBsAg⁻/anti-HBcor⁺ (lotul IIA) și 16 p. cu HBsAg⁺ (lotul IIB), s-a evaluat profilul lipidic prin aprecierea nivelului colesterolului seric. Pentru estimarea diferențelor statistice s-a utilizat criteriul t-student.

Rezultate

Comparând valorile colesterolului între loturi, s-au relevat valori mai elevate ale colesterolului în lotul II – $5,08 \pm 0,124$ mmol/l versus lotul I – $4,66 \pm 0,104$ mmol/l [$p < 0,01$]. S-au depistat de asemenea diferențe semnificativ statistice între nivelurile colesterolului pacienților din lotul IIA – $5,121 \pm 0,128$ mmol/l și lotul I [$p < 0,01$].



Concluzii

Prevalența persoanelor supraponderale și obeze, nivelul de colesterol mai ridicat la pacienții cu infecție VHB, relevă dereglări în metabolismul lipidic. Evidențierea acestor modificări și printre persoanele HBsAg⁻/anti-HBcor⁺, necesită examinarea ulterioară a lipidogramei desfășurate și la persoanele cu o posibilă infecție cronică ocultă VHB.