

fi combinată cu alte intervenții de modelare a corpului, inclusiv liposuctia sau alte intervenții. Fiecare procedură chirurgicală implică un anumit grad de risc și este important ca pacientul să înțeleagă riscurile implicate de intervenția de abdominoplastie: sîngerarea - are loc intra- și postoperator, infecțiile sunt neobișnuite după acest tip de operație, tratamentul include administrarea de antibiotice sau o altă intervenție chirurgicală, are loc modificarea sensibilității pielii, aspect neregulat al suprafeței pielii, complicații pulmonare, cicatrici anormale, asimetrii, reacții alergice, seroame, re poziționarea greșită a ombilicului, dureri cronice datorită nervilor implicați în cicatricile rezultate în urma abdominoplastiei.

## ABDOMINOPLASTY – SURGERY’S RISKS AND COMPLICATIONS

The surgery for bdominoplasty is a surgical procedure by which the excess of the skin and fatty tissue from the lower abdomen is removed, it may also involve the strengthening of the relaxed abdominal muscles. Plastic surgeons use a variety of techniques for abdominoplasty. This intervention can be combined with other interventions to shape the body, including liposuction or other interventions. Every surgical procedure involves some risks and it is important that patients understand the risks involved with abdominoplasty: bleeding - occurs intra- and postoperative; infections are uncommon after this type of surgery, treatment include antibiotics or another surgery, the change of sensitivity of the skin, irregular surface appearance of the skin, pulmonary complications, abnormal scars, asymmetry, allergic reactions, seromas, wrong navel position, chronic pain caused by the nerves involved in scar resulting from abdominoplasty.

I161

## AUGMENTARE MAMARĂ TRANSAREOLARĂ - RISCURILE ȘI COMPLICAȚIILE INTERVENȚIEI CHIRURGICALE

**Taran A., Gaponenco E.**

*Catedra Ortopedie – Traumatologie, USMF “N. Testemitanu”*

Intervenția de augmentare mamară este o intervenție chirurgicală efectuată pentru a mări sâni din diverse motive: pentru a obține un mai frumos contur al corpului femeii, care din motive personale simte că mărimea sânilor ei este prea mică; pentru a corecta o pierdere în volum a sânilor după o sarcină; pentru a obține un echilibru între mărimile sânilor atunci când există diferențe între cei doi sâni; ca metodă reconstructivă a sânilor din diferite motive; înlocuirea implanturilor mamare din considerente medicale sau cosmetice. Mărirea sânilor este realizată prin inserarea de implanturi mamare fie în spatele țesutului glandular ori sub mușchii pectorali. Inciziile sunt efectuate astfel încât să fie cât mai puțin vizibile, de obicei în jurul marginii inferioare a areolei. Metoda de inserție și poziționare a implanturilor mamare va depinde de preferințele pacientei, de anatomia și de recomandările chirurgului plastician. Fiecare procedură chirurgicală implică un anumit grad de risc: sîngerarea, infecția, contracții capsulare, modificarea poziției mamelonului și a sensibilității pielii, cicatricile, extrudarea implantului, ridarea pielii sau apariția neuniformităților pe suprafața pielii, calcifierea, migrarea implantului, contaminarea suprafeței implanturilor, deformarea peretelui toracic, reacții alergice, boli ale sînului, seroame, tromboze venoase, boli ale sistemului imunitar, sindromul șocului toxic.

## TRANSREOLAR BREAST AUGMENTATION - SURGERY’S RISKS AND COMPLICATIONS

The breast augmentation surgery is performed to increase the breasts size for various reasons: to get a better body contour in women, which for personal reasons feel that their breast size is too small, to correct loss of breast volume after a pregnancy, to achieve a balance between breast size when there are significant differences between the two breasts, as breast reconstruction method for various reasons, replacing breast implants fort medical or cosmetic reasons. Breast augmentation is achieved by inserting breast implants under the glandular tissue or behind the pectoral muscles. Incisions are made so that they are less visible, usually around the lower edge of the areola. The method of insertion and positioning breast implants will depend on patient preferences, anatomy and the plastic surgeon's recommendations. Every surgical procedure involves some degree of risk: bleeding, infection, capsular contraction, changing of the position of the nipple and skin sensibility, scarring, implant extrusion, skin wrinkling and unevenness in skin appearance, calcification, implant migration, implant surface contamination, deformation of the chest wall, allergic reactions, diseases of the breast, seromas, venous thrombosis, diseases of the immune system, toxic shock syndrome.

I162

## TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL EVENTRAȚIILOR GIGANTE ȘI RECIDIVANTE CU PLASA SINTETICĂ ÎNTR-UN PLAN ȘI DOUĂ PLANURI INTRAPERITONEALĂ INTEGRATĂ ÎN STRATUL MUSCULOAPONEUROTIC

**Vascan A., Lepadatu C., Grati S., Pugacescu Tatiana**

*Chirurgie generală, Spitalul Clinic Republican, Chișinău, Moldova*

Introducere. În tratamentul chirurgical al eventrațiilor postoperatorii mari și recidivante au fost aplicate diferite tehnici de plastii cu utilizarea materialelor sintetice, care au scopul de a reduce substanțial rată de recidive. Prezentăm o tehnică nouă de plastie cu plasă din polipropilen.