

K195

ROLUL CHIRURGIEI IN TRATAMENTUL CANCERELOR ESOFAGIENE AVANSATE

Danila N., Andronic D., Andronic Mihaela , Popa E., Dumitras O.

Clinica I-a Chirurgi U.M.F, Iasi

Lucrarea este un studiu retrospectiv a neoplasmelor esofagiene interne în Clinica I Chirurgie Iași între 2000 - 2009. După trecerea în revistă a datelor generale (sex, vârstă, posibilități de explorare, decizii terapeutice) a celor 71 de cazuri de neoplasme esofagiene interne în ultimii 10 ani, sunt prezentate sintetic cauzurile care au beneficiat de abord chirurgical. Sunt expuse elementele care au concurat la luarea unei anumite decizii terapeutice și analizate evoluția și complicațiile postoperatorii. Nu au fost incluse în observații tumorile eso-cardiotuberozitare care constituie un subiect al patologiei joncțiunii esogastrice. Procent de rezecabilitate al leziunilor avansate este extrem de redus (24,13%). Dacă în cancerle avansate pentru exereză nu se pornește pe ideea radicalității oncologice, având în vedere vârsta și fragilitatea acestor bolnavi considerăm utilă fractionarea gestului chirurgical în două sau trei etape, atitudine care pe seria noastră a redus mortalitatea perioperatorie. În cazurile inoperabile, by-pass-ul este o soluție valoroasă de rezolvare a disfagiei, dar complexitatea intervenției trebuie să pună în balanță beneficiul net al pacientului; de aceea se indică pentru bolnavii bine compensați biologic și funcțional, de vîrste acceptabile

THE SURGICAL APPROACH OF ADVANCED ESOPHAGEAL CANCERS

The therapeutical option was adapted to each case so for resectable tumors we apply a multimodal approach in 21 cases, a palliative approach in 12 cases and gastro or jejunostomy in 25 cases. The location of resectable tumors was cervical in 3 cases, mid third of esophagus in 11 cases, inferior third of esophagus in 4 cases and multiple tumor locations in 3 cases. The T.N.M. stages of operated tumors were especially stage III with 14 cases, Stage I one case, Stage II, 2 cases and Stage IV. 4 cases. A R0 resection was realized in 17 cases associated with a two field lymphadenectomy. We perform the operations in one step in 14 cases and in two steps in 7 cases. Considering esophagectomy with esophagoplasty the best palliation for esophageal cancers, we consider very important to adapt the surgical technique to the nutritional and biological status of the patient. So performing the operation in two steps we succeed to improve the survival rate as shown in our group of patients. The post operative mortality is of 4% In case of unresectable esophageal lesion the eso-gastric by-pass represents a good relief of dysphagia. We recommend this palliative attitude in case of patients with a good nutritional and biological status. The authors present a retrospective study of 58 epidermoid esophageal cancers treated in the I st Surgical Clinic U.M.F. Iasi, in the last decade 2000-2009. The eso-cardial tumors are excluded. The resectability of epidermoid esophageal cancers at the moment of the diagnosis was about 24, 13 %. The tumor location was: upper third of esophagus 10 cases, mid esophagus 33 cases, inferior third of esophagus 12 cases, multiple 3 cases. 51 cases (87, 9%) were complicated at the moment of the diagnosis: malnutrition 39 cases, bleeding 2 cases, pneumonia 6 cases (aspiration), eso-tracheal fistula 4 cases.

K196

ESOFAGECTOMIE TRANSHIATALA (CU TORACE INCHIS) SAU TRANSTORACICA (CU TORACOTOMIE) IN TRATAMENTUL CANCERULUI DE ESOFAG ?

Dragomir C.

UMF"G.T.Popa", Iasi

Introducere. Tehnicile chirurgicale de esofagectomie se impart, în funcție de calea de a-bord, în două mari categorii: transhiatale (ETH – cu torace inchis) și transtoracice (ETT cu toracotomie). Alegerea uneia sau alteia dintre tehnici se face în funcție de anumite criterii obiective dar și în funcție de preferința chirurgului. Scop. Pe baza experienței personale și a datelor din literatură se încearcă optimizarea alegerii uneia dintre cele două cai de abord. Material și metoda: 56 esofagectomii cu viza de radicalitate pentru cancer de esofag, dintre care 24 ETH (pe cale transhiatală) și 32 ETT (pe cale transtoracică). S-au comparat morbiditatea, mortalitatea și rezultatele postoperatorii imediate ale celor două tehnici. Rezultate. Diferențe statistic semnificative s-au înregistrat în privința complicațiilor: mortalitatea (12,5% pentru ETT și 4,2% pentru ETH), pneumonii (20,8% ETH și 6,2% pentru ETT) și ARDS – distressa respiratorie acută (12,5% pentru ETH și 6,2% pentru ETT). Cu toate acestea, mortalitatea nu a diferit semnificativ statistic: 16,7 pentru ETH și 15,6% pentru ETT (mortalitate globală 16%). Concluzii. - Starea biologică precară, și disfuncții respiratorii severe la bolnavi cu leziuni ale esofagului toracic inferior sau superior reprezintă criteriile obisnuite pentru indicația de ETH. Alternativa rezecției la vedere prin ETT este discutabilă din punct de vedere al eficienței oncologice dar crește riscul complicațiilor. Avantajele limfadenectomiei mediastinale pe cale transtoracică nu au fost demonstrează și există controverse în privința ratei supraviețuirii superioara la bolnavii cu ETT față de ETH. De aceea, indicațiile ETH se pot extinde la toate cauzurile la care este tehnic posibilă.

ESOFAGECTOMIE TRANSHIATALA (CU TORACE INCHIS) SAU TRANSTORACICA (CU TORACOTOMIE) IN TRATAMENTUL CANCERULUI DE ESOFAG ?

Introducere. Tehnicile chirurgicale de esofagectomie se impart, in functie de calea de a-bord, in doua mari categorii: transhiatale (ETH – cu torace inchis) si transtoracice (ETT cu toracotomie). Alegerea uneia sau alteia dintre tehnici se face in functie de anumite criterii obiective dar si in functie de preferinta chirurgului.Scop. Pe baza experientei personale si a datelor din literatura se incearca optimizarea alegerii uneia dintre cele doua cai de abord.Material si metoda: 56 esofagectomii cu viza de radicalitate pentru cancer de esofag,dintre care 24 ETH (pe cale transhiatala) si 32 ETT (pe cale transtoracica). S-au comparat morbiditate, mortalitate si rezultatele postoperatorii imediate ale celor doua tehnici.Rezultate. Diferente statistice semnificative s-au inregistrat in privinta complicatiilor: me- diastinita (12,5% pentru ETT si 4,2% pentru ETH), pneumonii (20,8 % ETH si 6,2% pen-tru ETT) si ARDS – detresa respiratorie acuta (12,5% pentru ETH si 6,2% pentru ETT). Cu toate aceste, mortalitatea nu a diferit semnificativ statistic: 16,7 pentru ETH si 15,6% pentru ETT (mortalitate globala 16%).Concluzii. - Starea biologica precara, si disfunctii respiratorii severe la bolnavi cu leziuni ale esofagului toracic inferior sau superior reprezinta criteriile obisnuite pentru indicatia de ETH. Alternativa rezectiei la vedere prin ETT este discutabila din punct de vedere al eficientei oncologice dar creste riscul complicatiilor. Avantajele limfadenectomiei mediastinale pe cale transtoracica nu au fost demonstate si exista controverse in privinta ratei supravietuirii superioara la bolnavii cu ETT fata de ETH. De aceea, indicatiile ETH se pot extinde la toate cazurile la care este tehnica posibila.

K197

ABORDUL MINIINVAZIV IN PATHOLOGIA TUMORALA ESOFAGIANA

Stanescu C., Tomulescu V., Stanciulea O., Romanescu D., Anghel C., Eftimie M., Popescu I.

Institutul Clinic Fundeni- Clinica Chirurgie Generala Si Transplant Hepatic “Dan Setlacec”

Chirurgia esofagiana este grevata de morbiditate si mortalitate crescute legate in special de trauma chirurgicala. Abordul miniinvaziv are ca scop optimizarea acestor parametri prin diminuarea traumei chirurgicale.Este prezentata experienta Centrului de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic “Dan Setlacec” din Institutul Clinic Fundeni in abordul miniinvaziv in patologia tumorala esofagiana

MINIINVASIVE APPROACH IN ESOPHAGEAL TUMORAL PATHOLOGY

Morbidity and mortality in esophageal resection remain high, due especially to surgical injury. Miniinvasive surgical approach is used in order to decrease both parameters, by lowering surgical associated trauma.The aim of this study is to analyze the outcome of patients referred for miniinvasive esophageal resection in Center for General Surgery and Liver Transplantation “Dan Setlacec” from Fundeni Clinical Institute.

K198

REZECTIA ESOFAGIANA EXPERIENTA CENTRULUI DE CHIRURGIE GENERALA SI TRANSPLANT HEPATIC” DAN SETLACEC” 2001-2011

Stanescu C., Eftimie M., Ionescu M., Brasoveanu V., Stroescu C., Dumitrascu T., Anghel C., Popescu I.

*Institutul Clinic Fundeni
 Clinica Chirurgie Generala Si Transplant Hepatic “Dan Setlacec”*

Chirurgia rectionala esofagiana este complexa prin varietatea substratului lezional, multitudinea cailor de abord precum si terenul biologic frecvent alterat al pacientilor. Scopul acestei lucrari este analiza rezultatelor postoperatorii imediate si tardive in randul pacientilor supusi rezectiei esofagiene in Centrul de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic” Dan Setlacec” in perioada 2001-2011.

ESOPHAGEAL RESECTION- EXPERIENCE IN CENTER OF GENERAL SURGERY AND LIVER TRANSPLANTATION “DAN SETLACEC” 2001-2011

Esophageal resection is a demanding surgical task due to various lesional substrat and type of surgical approach and, often, altered biological field of patients.The aim of this study is to analyze immediate and late outcome of patients referred for esophageal resection in Center for General Surgery and Liver Transplantation “Dan Setlacec” from Fundeni Clinical Institute along a decade (2001-2011).