

THE ROLE OF THE PREDISPOSING FACTORS IN THE TRIGGERING OF PSYCHOTIC DISORDERS DURING THE POSTPARTUM PERIOD

Baltag Ecaterina, Oprea Valentin

Scientific adviser: Oprea Valentin

Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology, *Nicolae Testemitanu* SUMPh

Background. Postpartum psychotic disorders continue to be a current problem in specialized medicine with a relatively low incidence (0.1-0.2% of mothers), but with an increased vital danger representing a psychiatric emergency with a high rate of hospitalization. **Objective of the study.** Elucidation of predisposing risk factors in the development of postpartum psychoses that required emergency hospitalization in psychiatric hospitals. **Material and Methods.** Studying the literature through scientific reference sources, databases such as PubMed, Medscape, Sciencedirect over the past 5 years to highlight the risk factors that contribute to the onset of postpartum psychotic states. **Results.** Postpartum psychoses have a sudden onset and develop from the first 48-72 hours after birth with a duration of up to one month under various psychotic manifestations: major psychotic depression with increased risk of suicide and infanticide (70%), schizophreniform disorders (20 %) and psychomotor agitation (10%). The primary risk factors are hormonal, biological and psychosocial. Postpartum psychotic disorders have shown to be caused by biological and hereditary factors rather than psychosocial and demographic factors. **Conclusion.** In the foreground are highlighted hormonal factors (changes in levels of estrogen, progesterone, cortisol, prolactin), biological (hereditary history of mental illness, family history of mood disorders), psychosocial (recent psychotraumatic events, inadequate social support).

Keywords: Postpartum period, risk factors, psychotic disorders.

ROLUL FACTORILOR PREDISPOZANȚI LA DECLANȘAREA TULBURĂRILOR PSIHOTICE ÎN PERIOADA POSTPARTUM

Baltag Ecaterina, Oprea Valentin

Conducător științific: Oprea Valentin

Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”

Introducere. Tulburările psihotice postpartum continuă să reprezinte o problemă actuală a medicinei de specialitate cu o incidență relativ scăzută (0,1-0,2% la suta de mame), dar cu o pericolozitate sporită vitală reprezentând o urgență psihiatrică cu rată majoră de spitalizare. **Scopul lucrării.** Elucidarea factorilor de risc predispozanți în dezvoltarea psihozelor postpartum ce au necesitat internare de urgență în spitalele de psihiatrie. **Material și Metode.** Studiarea literaturii de specialitate prin intermediul surselor de referință științifice, baze de date ca PubMed, Medscape, Sciencedirect pe parcursul ultimilor 5 ani pentru evidențierea factorilor de risc ce contribuie la declanșarea stărilor psihotice postpartum. **Rezultate.** Psihozele postpartum au un debut fulminant și se dezvoltă din primele 48-72 de ore după naștere cu o durată de până la o lună sub diferite manifestări psihotice: depresie majoră psihotică cu risc sporit de sinucidere și pruncucidere (70%), tulburări schizofreniforme (20%) și agitație psihomotorie (10%). Ca factori de risc primari sunt cei hormonal, biologici și psihosociali. S-a dovedit că tulburările psihotice postpartum sunt cauzate mai degrabă de factorii biologici și ereditari, decât de factorii psihosociali și demografici. **Concluzii.** În prim plan sunt evidențiați factorii hormonal (modificările nivelurilor de estrogen, progesteron, cortizol, prolactina), biologici (antecedente heredocolaterale de boli psihice, istoricul familial de tulburări de dispoziție), psihosociali (psihotraume recente, sprijin social).

Cuvinte-cheie: perioada postpartum, factori de risc, tulburări psihotice.