

ATEROSCLEROZA VASELOR MAGISTRALE LA PACIENȚII TINERI CU ICTUS ISCHEMIC

Rusu Irina¹, Grosu Oxana¹, Băitoi Silvia¹

¹Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Chișinău, Republica Moldova

Introducere


Studiile recente au demonstrat că incidența ictusului ischemic la adulții tineri a crescut, factorii de risc fiind diferiți de cei specifici pacienților vârstnici. Identificarea și corectarea factorilor de risc reprezintă o soluție importantă pentru reducerea morbidității și mortalității.

Cuvinte cheie

ictus ischemic, ateroscleroză, tablou clinic.

Scopul lucrării

Analiza comparativă a pacienților tineri cu accident vascular stratificați după prezența aterosclerozei vaselor magistrale.



Materiale și metode

A fost realizată analiza retrospectivă a tuturor fișelor de observație a pacienților cu AVC (1687) internați în Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” în perioada 2018- 2019, au fost identificați 56 pacienți cu vârstă sub 50 de ani, iar evaluare ultrasonografică au prezentat 44 pacienți, dintre care 31 bărbați și 11 femei.

Rezultate

	Pacienți cu ateroscleroza vaselor magistrale	Pacienți fără ateroscleroza vaselor magistrale
Debutul ictusului prin tulburări de conștiință	66,7%	33,3%
Debutul ictusului prin deficit neurologic	33,3%	66,7%
Debutul ictusului prin tulburări de vorbire	45,5%	54,5%
Tulburări de vorbire	60,0%	40,0%
Tulburări de sensibilitate	66,7%	33,7%
Pareze/ plegii	32,3%	67,7%
Sindrom bulbar	42,9%	57,1%

Concluzii

La pacienții tineri cu AVC și ateroscleroză a vaselor magistrale a predominat ca fenomen de debut tulburarea de conștiință iar clinic au prezentat tulburările de vorbire și sensibilitate, spre deosebire de pacienții fără ateroscleroză, unde mai frecvent s-au depistat pareze/plegii și sindrom bulbar. Aceste modificări ar putea fi explicate de tipul de AVC determinat de ateroscleroza vaselor mari și predilecția teritoriului.