

Simptomatologia clinică la copiii cu rinită cronică hipertrofică


Gheorghian Emilia - studenta USMF „ Nicolae Testemițanu”
Mihail Maniuc - conducător științific, dr. hab. șt. med., prof. universitar

Introducere: În prezent, obstrucția nazală cronică, datorată rinitei cronice hipertrofice este una din cele mai comune probleme întâlnite în rinologie. RCHC deși este o boală destul de frecventă la copii, simptomele sale sunt adesea subtile și nespecifice și acest lucru poate duce la trecerea cu vederea a diagnosticului



Cuvinte cheie: copii, hipertrofic, obstrucție nazală.

Obiectivele : Determinarea semnelor și simptomelor clinice ale rinitei hipertrofice la copii.



Metode și materiale: În studiu au fost incluși 65 de pacienți, cu vârsta de la 5 până la 18 ani, fiind internați în secția ORL a Spitalului Clinic Republican pentru copii „ Emilian Coțaga” or. Chișinău, cu diagnosticul de rinita cronică hipertrofică, pe parcursul anilor ianuarie 2018 - decembrie 2020. Acest studiu a fost realizat prin analiză retrospectivă a datelor din fișele de observație clinică, a documentelor de însoțire a fișelor, a protocoalelor operatorii a pacienților.

Rezultate: Semnele clinice și simptomele cele mai reprezentative conform studiului nostru sunt respirația nazală dificilă în 96,93 % și respirația bucală 89,24 %. Alte acuze incriminate au fost vocea nazonată în 83,08 %, fatigabilitate în 78,47 %, sforăit în 70,77 %, secreții sero-mucoase în 66,16 %, hiposmie în 49,24 % și cefalee în 32,31 % cazuri.

Concluzii: Rinita cronică hipertrofică reprezintă o entitate nozologică frecventă la copii, care afectează considerabil funcțiile fiziologice ale nasului. Cunoașterea aprofundată a modificărilor apărute sunt necesare și utile pentru a forma o corectă atitudine diagnostică și tereapeutică. Trebuie să menționăm că un diagnostic ratat al RCHC împiedică un management corect efectuat și este asociat cu investigații ineficiente și tratamente necorespunzătoare.