

Evaluarea factorilor de risc în comportamentul suicidar la bolnavi de schizofrenie

Author Popescu Romil , affiliation: Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală. Chișinău, Republica Moldova

Introduction

Schizofrenia este o maladie progredientă, invalidizantă cu diferite forme clinice. Bolnavii de schizofrenie paranoidă comit tentative de suicid în (18-20%) cazuri, dintre care (2,8-3%) sunt fatale. Sunt necesare evaluări multidimensionale a factorilor de risc în problema suicidului.

Purpose

Identificarea și analiza factorilor de risc în evaluarea suicidalității la bolnavi de schizofrenie, forma paranoidă, cu evoluție progredientă în accese.

Material and methods

Analiza literaturii contemporane și studiilor științifice efectuate în bazele de date, [www. Cambridge. org](http://www.Cambridge.org) , [www. APA. org](http://www.APA.org) , [www. Medscape.com](http://www.Medscape.com), pe parcursul ultimilor 3 ani pentru depistarea factorilor declanșatori în săvârșirea tentativelor de suicid la bolnavi de schizofrenie.

Results

Comportamentul suicidal este mai frecvent constatat la bolnavii de schizofrenie, forma paranoida. Analiza clinica indică prevalența suicidelor în cadrul sindroamelor depresiv-delirant (47,7%), halucinator-delirant(21,1%) și delirant (15,8%). Suicidele fatale sunt efectuate prin metode de strangulare(78%), intoxicație cu medicamente psihotrope (8%), aplicarea armelor reci(2%).Factori de risc de importanță primară au fost constatați cei biologici, psihologici și sociali.

Prevalența suicidelor în cadrul schizofreniei
paranoide





Diagrama 2. Metode de efectuarea suicidului în cadrul schizofreniei paranoide



Conclusions

La dezvoltarea comportamentului suicidal, la bolnavii de schizofrenie paranoidă ca factori de risc sunt cei biologici (antecedente de sinucidere în familie), psihologici (depresiile majore), sociali (consumul de alcool și droguri).

Keywords

Schizofrenie paranoidă, suicid, factori de risc.