

## PARTICULARITĂȚI CLINICO-PSIHOPATOLOGICE ÎN BOLILE ONCOLOGICE

**Loriana Popa**

(Conducător științific: Ghenadie Cărașu, dr. șt. med, conf. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală)

**Introducere.** Cancerul reprezintă una din cele mai grave maladii a secolului XXI. Povara reprezentată de această boală asupra individului, familiei și societății, dar și riscul sporit de dezvoltare al unor manifestări psihopatologice reprezintă un argument de a o considera ca fiind un obiectiv major de sănătate publică.

**Scopul lucrării.** Studierea particularităților clinico-psihopatologice ale bolnavilor oncologici și elaborarea intervențiilor terapeutice a pacienților.

**Material și metode.** Au fost examinați 62 bolnavi, 49 femei și 13 bărbați, internați în secția de radioterapie nr. 2 a Institutului Oncologic, cu vârsta cuprinsă între 40-70 ani. Datele au fost obținute în urma chestionării pacienților, utilizării scalei Spielberger (anxietate reactivă) și inventarului de depresie Beck.

**Rezultate.** Scala Spielberger denotă un nivel ușor de anxietate la 91,9% de pacienți, un nivel mediu de anxietate la 4,8% și un nivel înalt – la 3,3%. Scala Beck atestă o stare normală la 8,06 la sută din bolnavi, depresivă ușoară – în 80,64% din cazuri, iar la 11,29% – depresie moderată.

**Concluzii.** Pacienții cu cancer prezintă preponderent un nivel ușor de anxietate și de depresie.

**Cuvinte cheie:** cancer, anxietate, depresie.

## CLINICAL-PSYCHOPATOLOGICAL SPECIFIC FEATURES IN ONCOLOGICAL DISEASES

**Loriana Popa**

(Scientific adviser: Ghenadie Cărașu, PhD, associate professor, Chair of psychiatry, narcology and medical psychology)

**Introduction.** Cancer is considered to be one of the most severe diseases of the XXI century. The burden represented by it on the person, family and society, as well as the increased risk of developing of some psychopathological manifestations represent a reason to consider it as a major public health objective.

**Objective of study.** To study clinical-psychopathological specific features of oncological patients and to work out therapeutical interventions for them.

**Material and methods.** 62 patients, 49 women and 13 men have been examined, admitted in radiotherapy department nr. 2 of the Oncological Institute, aged 40-70 years old. The data were obtained as a result of questioning the patients and using of Spielberger scale (reactive anxiety) and of Beck depression inventory.

**Results.** Spielberger scale showed a light level of anxiety in 91.9% of the patients, an average level of anxiety in 4.8% and a high level in 3.3%. The Beck scale certifies a slight depression in 80.64% of cases and in 12.29% a moderate depression.

**Conclusions.** Oncological patients show show a slight level of anxiety and depression.

**Key words:** cancer, anxiety, depression.