

FACTORII DE RISC SUICIDAR ÎN SCHIZOFRENIE: REVIUL LITERATURII

Sorina Merlici

(Conducător științific: Mircea Revenco, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală)

Introducere. Riscul suicidar în schizofrenie este unul foarte înalt, ceea ce indică faptul că detectarea bolnavilor care se află la risc este foarte importantă din punct de vedere clinic.

Scopul lucrării. Identificarea factorilor de risc suicidă în schizofrenie.

Material și metode. Au fost studiate sursele din literatura internațională cu privire la suicidul persoanelor ce suferă de schizofrenie, prin căutarea acestui subiect în bazele de date electronice Medline, PsycInfo, Embase, Schizophrenia Research Journal, prin căutarea titlurilor: schizofrenie, suicid, factori de risc.

Rezultate. Au fost identificate 29 de studii eligibile. Rezultatele studiilor arată că factorii cei mai importanți ce prezintă risc suicidă marit au fost: prezența tulburărilor depresive în schizofrenie, tentative suicidare în anamneză, agitație psihomotorie, frica de a îmnebuni, complianță slabă la tratament, pierderea recentă a unui apropiat, abuz de substanțe psihooactive și halucinații.

Concluzii. În prevenirea suicidului în schizofrenie un rol foarte important îl au tratamentul simptomelor afective, îmbunătățirea complianței la tratament și creșterea vigilenței față de pacienții ce prezintă factori de risc suicidă.

Cuvinte cheie: schizofrenie, suicid, factori de risc.

RISK FACTORS OF SUICIDE IN SCHIZOPHRENIA: SYSTEMATIC REVIEW

Sorina Merlici

(Scientific adviser: Mircea Revenco, PhD, university professor, Chair of psychiatry, narcology and medical psychology)

Introduction. Suicide risk is greatly increased in schizophrenia, this indicates that detection of patients at risk is clinically important.

Objective of the study. To identify risk factors for suicide in schizophrenia.

Material and methods. The sources from international literature on suicide in patients suffering from schizophrenia were reviewed, through searching the electronic databases Medline, PsycInfo, Embase, Schizophrenia Research Journal, by searching the titles: schizophrenia, suicide, risk factors.

Results. Twenty-nine eligible studies were identified. The results of studies demonstrate that the most important factors of increased risk of suicide were: the presence of depressive disorders in schizophrenia, previous suicide attempts, agitation or motor restlessness, fear of mental disintegration, poor adherence to treatment, recent loss of a close person, drug misuse, and hallucinations.

Conclusions. A very important role in the prevention of suicide in schizophrenia have the treatment of affective symptoms, improving adherence to treatment, and increasing the vigilance in patients which present suicide risk factors.

Key words: schizophrenia, suicide, risk factors.