

PARTICULARITĂȚILE CLINICE ALE GASTRODUODENITELOR CRONICE LA COPII ÎN DEPENDENȚĂ DE FACTORI ETIOLOGICI

Inna Belaia

(Conducător științific: Ludmila Gasnaș, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de pediatrie)

Introducere. Inflamația cronică recidivantă a mucoasei și submucoasei stomacului și duodenului, cu tendință de progresare este cauzată de numeroși factori etiologici, principalul fiind *Helicobacter pylori*.

Scopul lucrării. Evaluarea particularităților clinice a gastroduodenitelor cronice la copii în dependență de factorii etiologici.

Material și metode. Au fost analizate 100 foi de observație clinică a bolnavilor cu gastroduodenite cronice în acutizare spitalizați în secția de gastroenterologie a IMȘIC în anii 2013-2014. Diagnosticul s-a efectuat în baza anamnezei cu determinarea factorilor etiologici, examenului clinic și endoscopic. Rezultatele studiului au fost analizate și interpretate statistic.

Rezultate. Nouăzeci și cinci procente din pacienți au prezentat sindromul algic, sindromul dispeptic – 98%, sindromul asteno-vegetativ a fost prezent la 73 copii – 73%. Sindromul algic cu localizare în epigastrul superior și periombilical în 90 cazuri. Durerile sîcîtoare, de intensitate moderată, combinate – 60%, postprandiale precoce – 30% dureri postprandiale tardive – 10%. *Helicobacter pylori* ca agent cauzal a fost depistat în 90 cazuri.

Concluzii. Tabloul clinic al gastroduodenitelor cronice a fost dominat de sindromul algic, dispeptic, astenovegitativ. Principalul factor etiologic a fost *Helicobacter pylori*.

Cuvinte cheie: gastroduodenita cronică, *Helicobacter pylori*.

CLINICAL FEATURES OF THE CHRONIC GASTRODUODENITIS IN CHILDREN DEPENDING ON ETHIOLOGICAL FACTORS

Inna Belaia

(Scientific adviser: Ludmila Gasnas, PhD, associate professor, Chair of pediatrics)

Introduction. Chronic inflammation of the gastric and duodenal mucosa and submucosa, with a tendency to progression is caused by many etiological factors, the main one is being *Helicobacter pylori*.

Objective of the study. Evaluation of clinical features of chronic gastroduodenitis in children depending on the etiological factors.

Material and methods. We've analyzed 100 medical records of children with chronic gastroduodenitis in acutisation, hospitalized in the Gastroenterology Department of the Mother and Child Institute during the 2013-2014 years. The diagnosis was based on the case history with the determination of etiological factors, clinical and endoscopic examination. The study results were statistically analyzed and interpreted.

Results. Ninety-five percents of patients experienced pain syndrome, 98% – dyspeptic syndrome, the astheno-vegetative syndrome was present in 73 children – 73%. The pain syndrome was localized in the upper epigastrium and periumbilical in 90 cases. A combined nagging pain of moderate intensity was in 60%, early postprandial – 30%, late postprandial – 10%. The *Helicobacter pylori* has been determined as an etiological factor in 90 cases.

Conclusions. The clinical picture of chronic gastroduodenitis was dominated by pain, dyspeptic and astheno-vegetative syndroms. The main etiological factor was *Helicobacter pylori*.

Key words: chronic gastroduodinitis, *Helicobacter pylori*.