

PARTICULARITĂȚILE INFECȚIEI DE TRACT URINAR LA PACIENȚI CU DIABET ZAHARAT TIP 2

Autorii: Ianulova Alina, Rotaru Larisa, Agachi Svetlana, Covtun Anna, Guțu Biatricia **Conducător științific:** Pascal Rodica

INTRODUCERE

După datele mondiale incidența infecțiilor a tractului urinar (ITU) constituie 40% la pacienții cu Diabet Zaharat tip 2 (DZ tip 2).

Factorii predispozanți: glucozurie
neuropatie diabetică a vezicii urinare

SCOPUL LUCRĂRII


Analiza ITU la pacienți cu DZ tip 2 tratat cu ADO și comparația datelor obținute din anul 2021 (12 luni) cu anul 2022 (5 luni).

MATERIAL ȘI METODE


- 141 f.o. a pacienților cu DZ tip 2 internați în IMSP Spitalul Clinic Republican « Timofei Moșneaga » secția Nefrologie
- Perioada 01.01.2021-31.05.2022.

REZULTATE

1. Distribuția pacienților pe sexe




2. Distribuția după grupe de vârstă



4. 2022 K. Pneumoniae (38%) – sensibilitatea la carbapeneme și aminoglicozide.

2022 Escherichia coli (50%) - sensibilitatea peste 90% la nitrofurani și carbapeneme.

3. Distribuția agenților patogeni în 2021/2022



CONCLUZII

Pacienții cu DZ tip 2 și ITU sunt în grupa de risc înalt de dezvoltarea rezistenței bacteriilor la preparate antibacteriene și au incidența crescută de infecții comunitare și nosocomiale (asociate cateterismului vezical).

CUVINTE-CHEIE

Infecție de tract urinar, K. pneumoniae, E. coli, Diabet Zaharat.