

## MORTALITATEA GENERALĂ DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE DE DECES ÎN REPUBLICA MOLDOVA

*Pisarenco Nadejda, IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie*  
*Condrațchi Diana, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”*  
*Pisarenco Serghei, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”*  
*Martîniuc Constantin, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”*

### Introducere

Elaborarea măsurilor care vizează reducerea mortalității populației și adoptarea deciziilor manageriale în domeniul sănătății sunt în dependență directă de fiabilitatea indicatorilor de mortalitate.


### Scopul lucrării

Elucidarea mortalității generale (MG) după principalele clase de deces în Republica Moldova în perioada anilor 2017-2021.

### Material si Metode

Analiza datelor oficiale MG în regiunile de pe malul drept ale Republicii Moldova fără mun. Bender în 2017-2021. Indicatorii relativi, dependenți de numărul populației, sunt raportați la numărul mediu al populației cu reședință obișnuită pentru anul 2021 (date provizorii). Principalele clase de deces sunt stabilite potrivit CIM, Revizia a 10-a a OMS.

### Structura mortalității pe principalele clase ale cauzelor de deces, 2021



### Rezultate

În 2017-2020 nivelul MG al populației s-a modificat ondulator cu tendință descendentă: 2017 – 36,8; 2018 – 37,3; 2019 – 36,4; 2020 – 40,7 și 2021 – 45,4 mii persoane. Totuși, în 2021 s-au înregistrat 45,4 mii de decese, adică cu 4721 (11,6%) mai mult decât în 2020. În același timp, structura MG a rămas practic neschimbată: principalele cauze de deces au fost bolile cardiovasculare (53,2%), urmate de tumori maligne (12,6%), bolile sistemului digestiv (6,3%), accidente, intoxicații și leziuni (4,2%), boli nespecifice ale aparatului respirator (BNAR, 4,4%) și 19,3% de alte cauze (preponderent decese cauzate de COVID-19). Majoritatea deceselor au avut loc în mediul rural (61,2%). În structura BNAR a predominat pneumonia – 62,1%; bronșita, emfizemul pulmonar și astmul bronșic, ce a constituit 32,8%. Aceste boli au avut de 1,7 ori mai multe șanse de a provoca deces la bărbați (B) decât la femeii (F). Raportul deceselor cauzate de BNAR în zonele rurale și urbane a fost 1,5:1, inclusiv din cauza pneumoniei – 1,3:1 și din BPOC – 5,1:1. Numărul B și F decedați din cauza BNAR în mediul rural a fost de 1,9 și, respectiv, de 1,4 ori mai mare decât în oraș.

### Concluzii

Rata MG în Republica Moldova în 2017-2021 a avut tendința de creștere; creșterea cu 11,6% în 2021 poate fi asociată cu epidemia COVID-19. Bolile cardiovasculare au rămas cauza principală a MG, urmate de tumori, boli sistemului digestiv și BNAR.

### Bibliografie

- Banca de date statistice Moldova.
- Anuarul Statistic al Republicii Moldova.