

DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL CONTEMPORAN AL TONSILITEI CRONICE LA LOCUITORII RURALI AI REPUBLICII MOLODOVA

Daniela Balagura, Irina Sîrghii

(Conducător științific: Vladimir Popa, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de otorinolaringologie)

Introducere. Tonsilita cronică reprezintă o patologie de o actualitate permanentă. În pofida faptului că este destul de raspândită în rândul populației, unele aspecte ale acestei probleme rămân nesoluționate și până astăzi.

Scopul lucrării. Stabilirea incidenței tonsilitei cronice la locuitorii rurali ai Republicii Moldova și efectuarea tratamentului conservator al tonsilitei cronice.

Material și metode. Au fost examinate 1500 de persoane din satele Republicii Moldova. Examenul a inclus: anamneza, examenul obiectiv, de laborator și paraclinic, consultația altor specialiști.

Rezultate. Persoanele examinate au prezentat peste 23 de acuze. Mai frecvente: discomfort în gât – 723 (48,2%); formarea dopurilor de cazeum – 651 (43,4%); angina în anamneză – 517 (34,5%). Tonsilita cronică compensată a fost diagnosticată la 163 (10,9%), tonsilita cronică tranzitorie la 78 (5,2%), tonsilita cronică decompensată la 113 (7,5%).

Concluzii. (1) Tonsilita cronică în rândul populației rurale constituie 23,6%; (2) Tratamentul bolnavilor cu tonsilita cronică a constat din: lavajul lacunelor cu sol. trachisan; administrarea de suprastin 25 mg o dată/zi – 10 zile; aplicarea de raze ultra scurte la proiecția tonsilelor palatine – 10 zile; gargarisme cu sol. NaCl 0,9% 2-3ori/zi – 10 zile; badijonarea mucoasei tonsilelor palatine și a mezofaringelui cu sol. lugol 1% – 10 zile. (3) Rezultatul tratamentului: ameliorarea simptomatologiei subiective și obiective la 75,6% dintre pacienți.

Cuvinte cheie: rural, incidență, diagnostic, tonsilită cronică, tratament, trachisan.

DIAGNOSIS AND CONTEMPORARY TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN RURAL RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Daniela Balagura, Irina Sîrghii

(Scientific adviser: Vladimir Popa, PhD, university professor, Chair of otorhinolaryngology)

Introduction. Chronic tonsillitis is a pathology of the permanent actuality. Despite the fact that it is widespread among the population some aspects of the problem remains unresolved definitively until today.

Objective of the study. Establiing the incidence of chronic tonsillitis of the rural inhabitants of the Republic of Moldova and planning the conservative treatment of chronic tonsillitis.

Material and methods. 1500 persons in the villages of the Republic of Moldova were examined. The examination included: medical history, physical and laboratory examinations and the consultation of other specialists.

Results. Examined persons presented more than 23 complaints. The most common ones were throat discomfort – 723 (48.2%), cazeum plugs formation – 651 (43.4%), a history of quinsy – 517 (34.5%). Compensated chronic tonsillitis was diagnosed in 163 (10.9%), chronic transient tonsillitis in 78 (5.2%), chronic decompensated tonsillitis in 113 (7.5%) patients.

Conclusions. (1) Chronic tonsillitis in rural population is found in 23.6%. (2) The treatment of patients with chronic tonsillitis consisted of : lavage of the gaps with sol. trachisan; suprastin administration 25 mg once a day for 10 days; short applications of ultra rays to the projection of the palatine tonsils for 10 days; gargles with sol. NaCl 0.9% 2-3 times per day for 10 days; sprinkling of the mucosa of the palatine tonsils and the mesopharynx with sol. Lugol 1% 10 days. (3) Treatment outcome: subjective and objective improvement of symptoms in 75.6% of patients.

Key words: rural, incidence, diagnosis, chronic tonsillitis, treatment, trachisan.