

TRATAMENTUL CONSERVATOR AL TONSILITEI CRONICE

Irina Turtureanu

(Conducător științific: Vladimir Popa, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de otorinolaringologie)

Introducere. Una din problemele medicinei fundamentale și practice este tonsilita cronică. Însemnătatea acestei probleme se explică prin faptul că ea este una din cele mai răspândite afecțiuni. Diagnosticul, tratamentul și profilaxia ei sunt dificile. Tonsilectomia are și ea multe complicații atât în perioada operatorie cât și cea postoperatorie.

Scopul lucrării. Studiarea eficacității tratamentului conservator al tonsilitei cronice.

Material și metode. Au fost tratați 60 pacienți, împărțiți în 3 grupe câte 20: (1) tonsilită cronică (TC), forma compensată; (2) TC tranzitorie; (3) TC decompensată. Tratamentul administrat: gargarisme de 2-3 ori pe zi cu sol. NaCl 0,9%; lavajul lacunelor tonsilare cu sol. trachisan; raze ultrascurte la proiecția tonsilelor palatine (10 zile); suprastin 25 mg – (1/zi, 7 zile); badijonarea mucoasei tonsilelor palatine cu sol. lugol 1% (10 zile).

Rezultate. Rezultatele tratamentului au fost apreciate conform: stării generale a pacientului, acuzelor până și după tratament, semnelor obiective. Au fost înregistrate însănătoșire: gr. 1 – la 20 pacienți (100%), gr. 2 – 95%, gr. 3 – 85%; ameliorare: gr. 2 – 5%, gr. 3 – 5%; starea a rămas aceeași: gr. 3 – 10%; complicații nu au fost înregistrate. Cele mai bune rezultate s-au stabilit la pacienții cu tonsilită cronică, forma compensată și tranzitorie.

Concluzii. Pentru prima dată s-a efectuat un tratament conservator după o asemenea metodă, cu asemenea preparate. S-a dovedit că tonsilita cronică decompensată poate fi și ea tratată conservator. Complicații la acești bolnavi nu s-au constatat, de asemenea nu au fost nici reacții adverse la preparatele administrate.

Cuvinte cheie: tonsilită cronică, tranzitorie, trachisan.

CONSERVATIVE TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS

Irina Turtureanu

(Scientific adviser: Vladimir Popa, PhD, university professor, Chair of otorhinolaryngology)

Introduction. One of the fundamental and practical medicine problems is chronic tonsillitis. This problem's importance is justified by the fact that it's one of the most wide-spread diseases worldwide. Its diagnosis, treatment and prophylaxis are difficult. Tonsillectomy leads to a lot of complications during the surgery and the post-surgery period.

Objective of the study. To study the efficiency of conservative treatment.

Material and methods. Sixty patients were treated and classified in 3 groups: (1) chronic tonsillitis (CT), compensated form – 20 patients; (2) transitory CT (n=20); (3) decompensated CT (n=20). Administrated treatment: gargles with NaCl 0.9% 2/3 times per day; tonsillar gaps lavage with trachisan; ultrashort rays projected on tonsils – 10 days; suprastin 25 mg – 1 pill/day, 7 days; embrocation of palatine tonsils mucosa with lugol 1% – 10 days.

Results. The treatment results were appreciated according to: patient's general condition, patient's complaints before and after treatment, objective signs. There were: complete healing in 1st group 20 patients (100%), group 2 – 95%, group 3 – 85%; improving in 2nd group: 5%, 3rd group: 5%; same state in 3rd group: 10%; complications: none. The best results were registered in the patients with chronic tonsillitis with compensated and transitory forms.

Conclusions. This method of conservative treatment was applied for the first time. It was proved that the decompensated form of chronic tonsillitis can be treated conservatively too. Complications and adverse effects were not noticed.

Key words: chronic tonsillitis, transitory, trachisan.