

MANIFESTĂRI ALE DEPRESIEI ÎN SCHIZOFRENIE

Sofia Chirioglo, Inga Deliv

Conducător științific: Inga Deliv

Catedra de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, USMF „Nicolae Testemițanu”

Introducere. Depresia poate fi în calitate de simptom caracterizat de dispoziție scăzută, disperare, descurajare, deznadejde, sau în calitate de sindrom psihopatologic constatat în diferite patologii psihice, precum tulburarea afectivă bipolară sau schizofrenia, dar și în calitate de stare clinică distinctă. **Scopul lucrării.** Studiarea particularităților simptomatice depressive în cadrul schizofreniei. **Material și metode.** A fost studiată și analizată literatura de specialitate cu privire la depresia din cadrul schizofreniei. **Rezultate.** Depresia este al treilea cel mai frecvent sindrom al schizofreniei care, complică în mod semnificativ prognosticul și evoluția bolii și contribuie major la mortalitatea prin suicid. Depresia, pe lângă simptomele negative și de afectarea cognitivă, este unul dintre cel mai importanți factori de dezadaptare la pacienții cu schizofrenie, care reduce semnificativ calitatea vieții și prognosticul bolii în ansamblu. Depresia și schizofrenia reprezintă entități nozologice psihiatrice diferite, dar care frecvent includ manifestări clinice asemănătoare. Pacienții din ambele categorii devin retrași, pasivi din punct de vedere social și reduc contactul cu familia și prietenii. **Concluzii.** Prezența depresiei în schizofrenie impune efectuarea unui diagnostic diferențiat foarte minuțios, care se va reflecta și asupra tacticii terapeutice. Depresia crește frecvența exacerbărilor și a internărilor repetate în spital, reduce calitatea și durata remisiunilor. **Cuvinte-cheie:** depresie, schizofrenie, remisiune, simptome pozitive și negative.

DEPRESSION IN SCHIZOPHRENIA

Sofia Chirioglo, Inga Deliv

Scientific adviser: Inga Deliv

Department of Mental Health, Medical Psychology and Psychotherapy, Nicolae Testemițanu University

Background. Depression can be as a symptom characterized by low mood, hopelessness, despondency, or as a psychopathological syndrome found in various mental pathologies such as bipolar affective disorder or schizophrenia, but also as a distinct clinical condition. **Objective of the study.** Studying the peculiarities of depressive symptoms in schizophrenia. **Material and methods.** The literature on depression in schizophrenia was studied and reviewed. **Results.** Depression is the third most common syndrome of schizophrenia, which significantly complicates the prognosis and course of the illness and is a major contributor to suicide mortality. Depression, in addition to negative symptoms and cognitive impairment, is one of the most important maladaptive factors in patients with schizophrenia, which significantly reduces the quality of life and prognosis of the disease as a whole. Depression and schizophrenia are different psychiatric nosological entities, but frequently include similar clinical manifestations. Patients in both categories become withdrawn, socially passive and reduce contact with family and friends. **Conclusion.** The presence of depression in schizophrenia requires a very thorough differentiated diagnosis, which will also be reflected in therapeutic tactics. Depression increases the frequency of exacerbations and repeated hospital admissions, reduces the quality and duration of remissions. **Keywords:** depression, schizophrenia, remission, positive and negative symptoms.