

VULNERABILITATEA BOLNAVILOR MINTALI ÎN CONTEXTUL STIGMATIZĂRII

Svetlana Condration, dr. în șt. med., cercet. științ. superior
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
Chișinău, R.Moldova svetlana.condration@usmf.md

VULNERABILITY OF MENTAL PATIENTS IN THE CONTEXT OF STIGMATIZATION

In the field of psychiatric care, the difficulties associated with moral and social discrimination of mentally ill people are quite pronounced, since this category belongs to the most vulnerable population. Patients face restriction of rights and stigmatization, which leads to less access to psychiatrists, with a subsequent negative impact on the course and prognosis of the disease.

Potrivit OMS, sănătatea mintală este o componentă integrală și esențială a sănătății. Sănătatea mintală împreună cu sănătatea fizică determină satisfacția socială și bunăstarea unei persoane și, ca urmare, o creștere a calității vieții. Psihiatria se ocupă în cea mai mare măsură de omul ca individ, având componente atât biologice, cât și mentale, spirituale și sociale. S.S. Korsakov notează: „Psihiatria, dintre toate științele medicale, ne aduce cel mai aproape de întrebările filozofice.” Psihiatria, ca obiect al reglementării legale și etice, îndeplinește o dublă funcție, protejând interesele pacientului și interesele societății. Acest lucru necesită dezvoltarea măsurilor preventive și identificarea principalelor surse de potențial vătămare asociate practicii psihiatrice.

În domeniul îngrijirii psihiatrice există dificultăți asociate discriminării morale și sociale față de persoanele bolnave mintal, întrucât această categorie aparține celei mai vulnerabile populații. În consecință, aceasta duce la o scădere a încrederii publicului, încălcarea demnității, limitarea drepturilor și stigmatizarea, ceea ce afectează semnificativ calitatea vieții pacientului și provoacă mai puțină atracție pentru psihiatri, cu un impact negativ ulterior asupra evoluției și prognosticului bolii.

În conștiința publică se obișnuiește să se distingă patru componente semantice independente ale stigmatizării. Componenta „control și respingere”

reflectă restrângerea drepturilor persoanelor bolnave mintal și distanțarea persoanelor sănătoase de acestea. Componenta „atitudine negativă față de psihiatrie” combină afirmații atât despre competența psihiatrilor și eficacitatea terapiei psihotrope, cât și despre frica de psihiatri, teama că aceștia pot dăuna chiar și persoanelor sănătoase. Componenta „respingere agresivă” reflectă percepția persoanelor cu boli mintale ca „oameni răi” - o povară pentru societate, până la dorința de a le distruge. Componenta „idei non-biologice despre boala mintală” pune sub semnul întrebării natura obiectivă a psihopatologiei și modelul medical al bolii mintale. S-a sugerat că boala mintală este rezultatul lipsei de voință, al caracterului slab, al unui semn de talent, al trezirii unor abilități speciale sau al pedepsei pentru păcate.

Trebuie menționat că sarcina bioeticii în psihiatrie este de a depăși stigmatizarea și de a crește toleranța societății față de bolnavii mintal. Cultivarea unei culturi umaniste a populației în raport cu această categorie de pacienți ar trebui să treacă la un nivel universal, incluzând reprezentanți ai legii, mass-media, medici, profesori și părinți. Un astfel de sistem de valori bioetice, bazat pe principiile fundamentale de protejare a drepturilor și libertăților pacienților care suferă de tulburări psihice, necesită cu siguranță consolidarea activității comisiei de etică din cadrul serviciului de psihiatrie.

ASPECTE PRIVIND RELAȚIA DINTRE SĂNĂTATE ȘI RUGĂCIUNE LA PREADOLESCENȚI ȘI ADOLESCENȚI

Dorin Opreș, dr. habil., prof. univ.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România

dorin_monica@yahoo.com

Monica Opreș, dr., prof.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, România

ASPECTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH AND PRAYER IN PREADOLESCENTS AND ADOLESCENTS

The issue of well-being is a constant in the debates in the public space, but also in the concerns of people of different ages. This article presents a series of data collected using the questionnaire applied to preadolescents