MANIFESTĂRILE OROFARINGIENE ÎN RUJEOLĂ - RELEVANŢA CLINICĂ ÎN PRACTICA STOMATOLOGICĂ

Olga Chiseeva[1], Liviu Iarovoi[2], Valentina Potâng-Raşcov[2]

Conducător ştiinţific: Lilia Cojuhari[1]

[1]Catedra de boli infecţioase, USMF "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova

[2]Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală, USMF "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova

Introducere. Rujeola este o boală infecţioasă virală acută, cu transmitere aerogenă, caracterizată prin manifestări generale şi locale cu prezenţa semnelor precoce la nivelul mucoasei orale. Leziunile orofaringiene, precum Semnul Filatov-Koplik are valoare diagnostică importantă în practica stomatologică. **Scop.** Evidenţierea manifestărilor orofaringiene specifice rujeolei în cadrul examinării clinice şi rolul acestora în facilitarea diagnosticului precoce în contextul evaluării stomatologice. **Material şi metode.** Studiul se bazează pe analiza descriptivă a unui lot de 60 pacienţi diagnosticaţi cu rujeolă, internaţi în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. Examinarea orofaringiană a fost efectuată în primele 3-5 zile de la debutul bolii. Datele au fost structurate pe categorii, în funcţie de vârstă, gen, antecedente epidemiologice şi manifestări clinice orale **Rezultate.** Studiul a inclus 60 de pacienţi diagnosticaţi cu rujeolă, vârsta medie fiind 19 ani, indicând o incidenţă crescută în rândul adulţilor tineri. Febra a fost simptomul predominant, iar contactul epidemiologic a fost confirmat în 21 de cazuri. Manifestările orale au avut o valoare diagnostică semnificativă, prin urmare Semnul Filatov-Koplik a fost identificat la 34,5% dintre pacienţi, manifestându-se în perioada prodromală pe mucoasa jugală în dreptul molarilor. Gingivita acută a fost prezentă la 44,8% dintre pacienţi. Leziunile mucoase au precedat erupţiile cutanate, contribuind la orientarea rapidă a diagnosticului. **Concluzii.** Manifestările orale reprezintă indicatori clinici relevanţi în diagnosticul precoce al rujeolei. Identificarea acestora facilitează confirmarea bolii şi contribuie la un management terapeutic optim, evidenţiind rolul esenţial al examenului stomatologic în cadrul evaluării pacientului. **Cuvinte-cheie:** rujeolă, semnul Filatov-Koplik, infecţie virală, simptome.

OROPHARYNGEAL MANIFESTATIONS IN MEASLES – CLINICAL RELEVANCE IN DENTAL PRACTICE.

Olga Chiseeva[1], Liviu Iarovoi[2], Valentina Potâng-Raşcov[2]

Scientific adviser: Lilia Cojuhari[1]

[1]Department of Infectious Diseases, *Nicolae Testemiţanu* University, Chişinău, Republic of Moldova

[2]Department of Infectious, Tropical Diseases and Medical Parasitology, *Nicolae Testemiţanu* University, Chişinău, Republic of Moldova

Introduction. Measles is an acute viral infectious disease with airborne transmission, characterized by both general and local clinical symptoms, including early manifestations on the oral mucosa. Oropharyngeal lesions, such as the Filatov-Koplik sign, possess significant diagnostic value in dental practice. **Objective.** To highlight the specific oropharyngeal manifestations of measles during clinical examination and assess their role in facilitating early diagnosis in the context of dental evaluation. **Material and methods.** The study is based on a descriptive analysis of 60 patients diagnosed with measles and hospitalized at the Clinical Infectious Diseases Hospital. Oropharyngeal examinations were done within the first 3–5 days from the onset of the disease. Data were categorized by age, gender, epidemiological history, and oral clinical manifestations. **Results.** The study included 60 patients with confirmed measles, with a mean age of 19 years, indicating a higher incidence among young adults. Fever was the predominant symptom, and epidemiological contact was confirmed in 21 cases. Oropharyngeal manifestations were diagnostically significant: the Filatov-Koplik sign was identified in 34.5% of patients, typically appearing during the prodromal phase on the buccal mucosa opposite the molars. Acute gingivitis was present in 44.8% of patients. In the majority of cases, mucosal lesions preceded the characteristic measles exanthema, thus contributing to rapid diagnostic orientation. **Conclusion.** Oral manifestations serve as important clinical indicators in the early diagnosis of measles. Their identification supports disease confirmation and contributes to appropriate therapeutic management, emphasizing the essential role of dental examination in patient assessment. **Keywords:** Measles, Filatov-Koplik sign, Viral infection, symptoms.