

FRICA DE TRATAMENTUL DENTAR LA COPII

Eugenia Ferdohleb, Lupu Andreea

(Cond. șt. – Daniliuc Natalia, dr. în psihologie, cat. Economie, Management și Psihopedagogie)

Introducere. Stomatofobia e unul din motivele principale ale ne adresării cu scop profilactic / curativ la timp a copiilor la stomatolog. Astfel, sarcina stomatologilor, psihologilor și a părinților e de a-i ajuta pe copii să evaluateze amenințarea și să-și confrunte teama. Dacă acestea nu se realizează, copilul va accepta tratamentul dental cu mare dificultate, sau îl va ignora completamente. Astfel, i se va contura atitudinea cu privire la tratamentul dental pentru toată viața.

Scop. Analiza studiilor despre factorii ce influențează comportamentul copiilor în cadrul tratamentului stomatologic și a metodelor de atenuare a acestora.

Material și metode. Au fost studiate 28 de articole relevante din perioada 1998 – 2013, folosind baza de date PubMed și următoarele cuvinte cheie: odontofobie, stomatofobie, copii.

Rezultate. Conform datelor studiate stomatofobia se atestă în 16,6% cazuri (10,2-20%). Factorii incriminați în declanșarea fricii la copii sunt: durerea (30%), anticiparea ei (20%), coeficientul inteligenței emoționale scăzut (10%), separarea de părinți (5%), teama de necunoscut (10%), neîncredere (10%), intruziunea (10%), nivelul de socializare scăzut (5%). Statistic, s-a constatat că rata stomatofobiei se atestă la copii cu vârstă de 9 – 11 ani, prevalând la fete.

Concluzii. Cei mai frecvenți factori care influențează comportamentul copiilor în cadrul tratamentului stomatologic au fost: frica față de durere și anticiparea ei; neîncredere în medic, teama față de necunoscut și intruziune. Majoritatea lor pot fi atenuați prin cooperarea cu întreaga familie. Iar oportunitatea terapiei cu un stomatolog permanent va influența pozitiv atitudinea copilului față de tratamentul și igiena orală.

Cuvinte cheie. Stomatofobie, copii, control, încredere

FEAR OF DENTAL TREATMENT AMONG CHILDREN

Eugenia Ferdohleb, Lupu Andreea

(Sci. adviser: Daniliuc Natalia, PhD., chair of Economy, Management, and Psychopedagogy)

Introduction. Stomatophobia is one of the main reasons for children of not seeing the dentist with prophylactic / curative purpose. The assignment of the dentists, psychologists and parents is to help children to evaluate the threat, and to confront their fear. Unless they are fulfilled, there could be found situations in which the child accepts the treatment with great difficulty or avoids it totally. Thus, the attitude towards the dental treatment for the whole life, will be outlined.

Purpose. To study the factors influencing children's behavior during dental treatment and mitigation methods.

Material and methods. It was studied 28 relevant articles from the period 1998 to 2013, using the PubMed database and the following keywords: odontophobia, stomatophobia, children.

Results. According to the studies stomatofobia is observed in 16.6% cases (10.2 to 20%). Factors incriminated in triggering fear in children are: pain (30%) it's anticipation (20%), low emotional intelligence quotient (10%), separation from parents (5%), fear of the unknown (10%), distrust (10 %), intrusion (10%), the low social level (5%). Statistically, it was confirmed that the incidence of stomatophobia is observed at 9-11 years old children, being prevalent in girls.

Conclusions. The most frequent factors influencing children's behavior in dental treatment were: fear of pain and its anticipation; distrust in physician, fear of the unknown and intrusion. Most of them can be mitigated through cooperation with the whole family. The opportunity of therapy with a permanent dentist will positively influence the child's attitude towards treatment and oral hygiene.

Key words. Stomatophobia, children, control.