

PARTICULARITĂȚILE TRATAMENTULUI BOLNAVILOR CU SCHIZOFRENIE ÎN ACUTIZARE ASOCIATĂ CU ABUZ DE ALCOOL

Galina Gorbatova

(cond. șt. - Inga Deliv, dr. șt. med., conf. univ., cat. Psihiatrie)

Introducere. Utilizarea substanțelor psihoactive de către pacienții cu tulburări psihice este un fenomen larg răspândit, care necesită o monitorizare clinică atentă pe durata evoluției bolii în special, la pacienți care fac abuz de alcool.

Scop. Investigarea tabloului clinic și caracteristicile terapiei la pacienții cu schizofrenie, cu antecedente ale consumului de alcool.

Material și metode. Studiul a inclus 20 de bărbați în vârstă de 24-46 ani bolnavi de schizofrenie în acutizare asociată de abuz de alcool (Lot 1 = F 20.0 + F 10.1) și 10 pacienți bolnavi doar de schizofrenie (Lot 2 = F 20.0). Pentru evaluare s-a folosit scala PANSS.

Rezultate. Scorul total PANSS pentru Lotul 1 a fost de 74,5 puncte, din care 19,6 puncte în simptome pozitive și 22,3 în cele negative. Pentru Lotul 2, cifrele au fost respectiv de 89,7, 24,5 și 21,9. În tratamentul ambelor grupuri în primele săptămâni s-a administrat Haloperidol, apoi o combinație de Risperidonă cu Clozapină. După o lună de tratament reducerea în PANSS pentru psihopatologie generală a fost de 25,1% pentru Lotul 1 și de 16,6% pentru Lotul 2.

Concluzii. La bolnavii din Lotul 1 se evidențiază simptomatologia negativă, pe când la cei din Lotul 2 – simptomatologia pozitivă. Reducerea simptomelor a decurs mai rapid la pacienții din Lotul 1 pe fundal de tratament al combinației dintre Risperidonă și Clozapină.

Cuvinte cheie. Schizofrenie, alcool, PANSS, tratament, Risperidonă, Clozapină.

TREATMENT CHARACTERISTICS IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN AGGRAVATION ASSOCIATED WITH ALCOHOL ABUSE

Galina Gorbatov

(Sci.adviser: Inga Deliv, PhD., associate prof., chair of Psychiatry)

Introduction. The use of psychoactive substances by patients with mental disorders is a widespread phenomenon that requires intent clinical monitoring during the course of the disease especially in patients who abuse alcohol.

Purpose. Investigation of clinical picture and treatment characteristics in schizophrenic patients with a history of alcohol consumption.

Material and methods. The study included 20 patients aged 24-46 years with schizophrenia in aggravation associated with alcohol abuse (Lot 1 = F 20.0 + F 10.1) and 10 patients with schizophrenia only (Lot 2 = F 20.0). Scale PANSS for evaluation was used.

Results. PANSS total score for Lot 1 was 74,5 points, 19,6 points for the positives symptoms and 22,3 – for negatives one. For Lot 2, the figures were respectively 89,7, 24,5 and 21,9. In both treatment groups during the first week was given Haloperidol, then combination of Risperidone and Clozapine. After one month of treatment the reduction in PANSS for general psychopathology was 25,1% for Lot 1 and 16,6% for Lot 2.

Conclusions. In patients of Lot 1 highlights the negatives symptoms, while those in Lot 2 - positives symptoms. Reducing symptoms went faster in patients of Lot 1 background treatment of the combination of Risperidone and Clozapine.

Key words. Schizophrenia, alcohol, PANSS, treatment, Risperidone, Clozapine .