

CALITATEA VIEȚII BOLNAVILOR CU SCHIZOFRENIE

Pritula Lucia

(Cond. șt. – Inga Deliv, dr. șt. med., conf. univ., cat. de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie clinică).

Introducere. Problema calității vieții a pacienților psihiatrici este una dintre cele mai actuale și activ dezvoltate domenii la etapa modernă, o mare atenție se acordă abordării complexe a diagnosticului și tratamentului patologiei mentale, cu implicarea nu doar factorilor clinico-psihopatologici, dar, și a celor sociali, de mediu, psihologici și existențiali.

Scop. Evaluarea calității vieții pacienților ce suferă de schizofrenie în funcție de simptomatologia psihotică și în ce măsură vârsta și durata bolii afectează calitatea vieții.

Material și metode. În studiu au fost incluși 20 pacienți cu Schizofrenie paranoidă. Pentru a evalua calitatea vieții au fost testați PANSS și WHOQOL-BREF la internare și la externarea din Spitalul clinic de psihiatrie.

Rezultate. Indicele de calitate a vieții crește în toate domeniile de la prima la a doua vizită pe fondul ameliorării simptomatologiei psihotice ($P < 0,001$). Între nivelul PANSS și indicele de calitate a vieții există o corelare negativă, corelarea însă fiind una slabă ($r = - 0,45$). O corelare înaltă s-a determinat între durata bolii și indicele de calitate a vieții ($r = - 0,60$), fiind de asemenea una inversă. Corelarea după Pearson între vârsta pacienților și indicele de calitate a vieții este la fel negativă și s-a adevărat a fi una și mai strânsă ($r = - 0,70$).

Concluzii. Odată cu ameliorarea simptomatologiei psihotice are loc o creșterea scorurilor în toate domeniile de calitate a vieții. Odată cu scăderea scorului PANSS crește indicele de calitate a vieții. Calitatea vieții scade odată cu înaintarea în vârstă și cu creșterea duratei bolii.

Cuvinte cheie. Calitatea vieții, schizofrenie.

QUALITY OF LIFE OF IN SCHIZOPHRENIA

Pritula Lucia

(Sci.adviser: Deliv Inga MD., PhD., associate prof., chair of Psychiatry, Narcology and Clinical Psychology).

Introduction. The issue of quality of life of psychiatric patients is one of the most current and active developed areas on the modern stage, more attention is paid to the complex approach of diagnosis and treatment of mental pathology, involving not only the clinical and psychopathological factors, but also social, environmental, psychological and existential.

Purpose. Evaluation of quality of life of patients suffering from schizophrenia according to psychotic symptoms and to what extent the age and disease duration affect the quality of life.

Material and methods. The study included 20 patients with paranoid schizophrenia. To assess the quality of life, the patients were tested WHOQOL-BREF and PANSS at admission and discharge from the psychiatric hospital.

Results. Index of quality of the life increases in all domains from the first to second visit due to psychotic symptomatic improvement ($P < 0.001$). Between the PANSS and the index of quality of life there is a negative correlation, however, the correlation is poor ($r = - 0.45$). A high correlation is determined between disease duration and quality of life index ($r = - 0.60$), and it is also reversed. The correlation after Pearson between patient age and quality of life index is negative and turned out to be even closer ($r = - 0.70$).

Conclusions. With improvement of psychotic symptoms increased scores in all domains of quality of life. As PANSS scores decrease, the quality of life index increases have occurred. The quality of life decreases with age increase and illness duration.

Key words. Quality of life, schizophrenia.