

PARAMETRII LINIARI AI SPLINEI: STUDIU MORFOMETRIC ȘI ECOGRAFIC

Belic O.

Catedra de anatomică a omului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova
Corresponding author: anatom@usmf.md

Abstract

LINEAR PARAMETERS OF SPLEEN: A MORPHOMETRIC AND ECHOGRAPHIC STUDY

Background: Knowing structural aspects of spleen is of interest, especially in surgical interventions, particularly in modern times when surgical interventions wider take place with maximal preserving injured organs, including in abdominal trauma.

Material and methods: Linear dimensions of spleen, i. e. length and width, were studied by morphometric and echographic methods. Descriptive statistics allowed presenting results in tables.

Results: Difference in spleen length depending on gender is statistically significant, the mean value is $119,2 \pm 1,26$ mm in men, and $105,1 \pm 2,07$ mm in women ($p < 0,001$). As for spleen width, statistically significant difference depending on gender is in Group VII – $77,2 \pm 2,11$ mm in men and $61,6 \pm 2,25$ mm in women; in age Group VIII₁ – $78,1 \pm 2,07$ mm in men and $59,2 \pm 2,16$ mm in women ($p < 0,001$).

Conclusions: Comparison of ultrasonic examination results and morphometric parameters reveals statistically significant difference $p < 0,001$.

Key words: spleen, linear dimensions, morphometric parameters, ultrasonic examination.

Introducere

Lezjunile splinei de origine traumatică se întâlnesc tot mai frecvent în ultimul timp [5].

Conform unor relatări, numărul lor este în creștere, incidența variind de la 15,5% [6], traumatisme încise, până la 58,17%, traumatisme deschise ale abdomenului, din totalitatea leziunilor asociate toraco-abdominale [4].

Cunoașterea aspectelor structurale ale splinei prezintă interes, în special, în intervențiile operatorii, atât urgente, cât și planificate, îndeosebi la etapa actuală când intervențiile chirurgicale se practică tot mai larg cu păstrarea maximă a organelor lezate prin traumatisme izolate sau asociate ale abdomenului.

Totodată, particularitățile structurale ale splinei inclusiv parametrii liniari (lungimea, lățimea, forma organului nu permite a stabili cu exactitate grosimea lui), care pot fi stabiliți pe material cadaveric, morfometric, precum și pe viu, ecografic.

Apropo, în ecografie totdeauna a fost necesară o cunoaștere perfectă a particularităților structurale ale regiunilor corpului uman, ale fiecărui organ în parte, precum și a raporturilor lor stereometrice. Cele menționate, firește, se referă și la splina umană. Din aceste considerente am realizat actualele cercetări.

Scopul studiului

Actualele cercetări au drept scop stabilirea unor parametri liniari ai splinei la om, pe material cadaveric – morfometric și pe viu – ecografic.

Material și metode

Deși studiul morfometric a fost supus material cadaveric, prelevat de la 184 subiecți decedați, preponderent, în urma diverselor traumatisme.

Lotul supus studiului morfometric include 106 bărbați și 78 femei.

Vârstele lor variau între 18 și 84 de ani. În funcție de perioadele de vîrstă, cazurile s-au repartizat în felul următor. Perioadei a VII-a i-au revenit 26 cazuri, inclusiv 16 bărbați și 10 femei, perioadei VIII₁ – 28 cazuri, respectiv 20 bărbați și 8 femei, perioadei VIII₂ – 50 cazuri, respectiv 30 bărbați și 20 femei, perioadei IX – 40 cazuri, respectiv 20 bărbați și 20 femei, perioadei X – 40, respectiv 20 bărbați și 20 femei.

Analizei au fost supuse și 119 ecograme ale pacienților (53 bărbați și 66 femei), care au constituit lotul II de studiu.

Conform perioadelor de vîrstă, cazurile au fost grupate în felul următor: perioadei VIII₁, i-au revenit

13 bărbați și 9 femei, perioadei VIII, respectiv, 18 bărbați și 20 femei, perioadei IX – 13 bărbați și 20 femei, perioada de vîrstă X a fost reprezentată de 9 bărbați și 17 femei.

Statistica descriptivă a permis prezentarea rezultatelor prin tabele.

Rezultate și discuții

În descrierea particularităților structurale ale fiecărui organ un loc deosebit îl ocupă parametrii liniari. Ei devin unul dintre criteriile de bază în stabilirea prezenței proceselor patologice, determinând, totodată, manifestările clinice ale maladiei, deoarece structura și starea funcțională a substratului tisular – ansamblul morfofiziologic – reprezintă un proces unitar care asigură vitalitatea fiecărui organism [3].

Dimensiunile liniare și masa splinei pot varia foarte mult, mai ales în cazuri patologice: organul este mărit în tuberculoză, malarie, febră tifoidă, sifilis [1, 2]. Sub unghiul de vedere al variabilității individuale a splinei se subîntregesc dimensiunile liniare (lungimea, lățimea) care dispun de o anumită gamă variațională.

Dimensiunile splinei au fost studiate pe macropreparate la maturi, în dependență de vîrstă și de sex. Informație conchisă referitoare la valorile medii ale dimensiunilor splinei în funcție de apartenență de grupul de vîrstă, sex și numărul cazurilor cercetate este prezentată în tabelele 1, 2.

Tabelul 1

Lungimea splinei în funcție de sex

Grupuri de vîrstă	Bărbați, n		Femei, n		t	p
	Abs.	$M_1 \pm ES_1$ (mm)	Abs.	$M_2 \pm ES_2$ (mm)		
VII	16	$121,5 \pm 3,12$	10	$94,7 \pm 2,09$	7,1365	<0,001
VIII ₁	20	$125,1 \pm 3,08$	8	$85,8 \pm 2,11$	10,527	<0,001
VIII ₂	30	$119,2 \pm 3,16$	20	$113,9 \pm 2,14$	1,3887	>0,05
IX	20	$124,1 \pm 3,41$	20	$122,2 \pm 2,12$	0,4732	>0,05
X	20	$105,5 \pm 2,54$	20	$109,1 \pm 2,08$	1,0966	>0,05
Total	106	$119,2 \pm 1,26$	78	$105,1 \pm 2,07$	5,8185	<0,001

Tabelul 2

Lățimea splinei în funcție de sex

Grupuri de vîrstă	Bărbați, n		Femei, n		t	p
	Abs.	$X_1 \pm ES_1$ (mm)	Abs.	$X_2 \pm ES_2$ (mm)		
VII	16	$77,2 \pm 2,11$	10	$61,6 \pm 2,25$	5,0574	<0,001
VIII ₁	20	$78,1 \pm 2,07$	8	$59,2 \pm 2,16$	6,3174	<0,001
VIII ₂	30	$79,0 \pm 2,08$	20	$79,1 \pm 2,17$	0,0333	>0,05
IX	20	$84,5 \pm 2,19$	20	$80,0 \pm 2,19$	1,4971	>0,05
X	20	$71,4 \pm 2,14$	20	$69,8 \pm 2,35$	0,5034	>0,05
Total	106	$78,2 \pm 2,22$	78	$69,9 \pm 2,15$	2,6857	<0,01

Notă: Repartizarea materialului investigat conform perioadelor ontogenezei are la bază periodizarea de vîrstă adoptată la Simpozionul Institutului de fiziolgie de vîrstă a AŞPA URSS (după A. A. Маркосин (1969), С. Б. Тихвинский, С. В. Хрущев (1991), precum și cea propusă de R. Robacki (citat după M. Ștefanet și coau., 2000). Femei : VII – 16-20 ani, VIII₁ – 21-35 ani, VIII₂ – 36-55 ani, IX – 56-74 ani, X – 75-90 de ani. Bărbați: VII – 17-21 ani, VIII₁ – 22-35 ani, VIII₂ – 36-60 ani, IX – 61-74 ani, X – 75-90 de ani.

În baza informației obținute (tab. 1), putem conchide că diferența în funcție de apartenența de sex este statistic semnificativă, media – $119,2 \pm 1,26$ mm la persoanele de sex masculin, incluse în I lot de studiu, și $105,1 \pm 2,07$ mm la cele de sex feminin, incluse în lotul II de studiu ($p < 0,001$).

Diferența este statistic semnificativă și pentru lungimea splinei în grupurile de vîrstă VII și VIII₁ – $121,5 \pm 3,12$ mm și $125,1 \pm 3,08$ mm, respectiv, la persoanele de sex masculin; $94,7 \pm 2,09$ mm și $85,8 \pm 2,11$ mm, respectiv – la cele de sex feminin ($p < 0,001$). În grupurile VIII₂, IX diferența în funcție de apartenența de sex nu este statistic semnificativă ($p > 0,05$).

Lungimea organului la persoanele de sex masculin este puțin mai mare decât la cele de sex feminin ($119,2 \pm 3,16$ mm și $113,9 \pm 2,14$ mm; $124,1 \pm 3,41$ mm și $122,2 \pm 2,12$ mm).

Analiza rezultatelor prezentate în tabelul 2 se referă la diferența lățimii splinei în funcție de apartenența de sex, statistic semnificativă în grupul VII – $77,2 \pm 2,11$ mm la bărbați și $61,6 \pm 2,25$ mm la femei; în grupul de vîrstă VIII₁ – $78,1 \pm 2,07$ mm la persoanele de sex masculin și $59,2 \pm 2,16$ mm la cele de sex feminin.

Diferența în funcție de apartenența de sex este statistic semnificativă ($p < 0,001$). În grupurile VIII₂, IX și X diferența nu este statistic semnificativă ($p > 0,05$). Valorile parametrilor lățimii splinei la bărbați sunt aproape egale cu cele ale persoanelor de sex feminin.

Dimensiunile lineare ale splinei la maturi în funcție de apartenența de gen și vîrstă au fost studiate prin examinarea USG pe un lot care cuprinde 119 de pacienți (53 bărbați și 66 femei) la care nu s-a constatat prezența cărora maladiei ale splinei.

Datele referitoare la valorile medii ale dimensiunilor splinei în dependență de vîrstă, gen și numărul cazurilor cercetate sunt prezentate în tabelele 3,4.

Informația reflectată în tabelul 3 arată diferența în funcție de apartenența de sex statistic semnificativă pentru grupul de vîrstă VIII₂ – $103,5 \pm 2,05$ mm la persoanele de sex masculin și $113,0 \pm 3,12$ mm la cele de sex feminin ($p < 0,05$).

În grupurile de vîrstă VIII₁, IX și X pentru lungimea organului nu este înregistrată diferență statistic semnificativă în funcție de apartenența de sex.

Dimensiunile lungimii organului la bărbați sunt aproape egale cu valorile medii la persoanele de sex feminin ($p > 0,05$).

Tabelul 3

Lungimea splinei în funcție de gen, după datele ecografice

Grupurile de vîrstă	Bărbați, n=53		Femei, n=66		t	p
	Abs.	M±ES (mm)	Abs.	M±ES (mm)		
VIII ₁	13	$113,84 \pm 4,25$	9	$112,0 \pm 5,01$	0,2801	>0,05
VIII ₂	18	$103,5 \pm 2,05$	20	$113,0 \pm 3,12$	2,5447	<0,05
IX	13	$99,6 \pm 1,54$	20	$105,4 \pm 3,42$	1,5464	>0,05
X	9	$107,1 \pm 1,33$	17	$101,4 \pm 2,74$	1,715	>0,05
Total	53	$106,01 \pm 2,03$	66	$107,95 \pm 1,61$	0,7488	>0,05

Datele referitoare la valorile medii ale lățimii organului (tab. 4) arată diferență statistic semnificativă în funcție de apartenența de sex în grupurile de vîrstă VIII₂ și IX ($p < 0,05$).

Valorile medii ale lățimii în grupurile analizate sunt $38,8 \pm 1,46$ mm, $35,2 \pm 2,01$ mm respectiv pentru bărbați și $42,85 \pm 1,08$ mm, $40,45 \pm 1,36$ mm – pentru femei.

Parametrul linear (lățimea) al organului pentru grupurile VIII₁, și X în funcție de apartenența de sex nu are diferență statistic semnificativă ($p > 0,05$).

Tabelul 4

Lățimea splinei în funcție de vârstă și sex după datele ecografiei

Grupurile de vârstă	Bărbați, n=53		Femei, n=66		t	p
	Abs.	M±ES (mm)	Abs.	M±ES (mm)		
VIII ₁	13	42,0±1,05	9	42,60±1,98	0,2677	>0,05
VIII ₂	18	38,8±1,46	20	42,85±1,08	2,2301	<0,05
IX	13	35,2±2,01	20	40,45±1,36	2,1633	<0,05
X	9	39,3±2,47	17	38,29±2,02	0,3165	>0,05
Total	53	38,83±1,75	66	41,05±1,61	0,9336	>0,05

Compararea rezultatelor lungimii organului la bărbați, obținute prin analiza parametrilor morfometrii și rezultatelor examinării USG afirmă diferență statistic semnificativă în grupurile de vârstă VIII₁, VIII₂, IX și în total – p<0,05; 0,001; 0,001 (tab. 5). Pentru grupul de vârstă X diferența nu este statistic semnificativă (p>0,05).

Tabelul 5

Compararea rezultatelor lungimii splinei la bărbați după datele ecografice și morfometrice

Grupurile de vârstă	Bărbați, n=53		Bărbați, n=106		t	p
	Abs.	M±ES (mm)	Abs.	M±ES (mm)		
VIII ₁	13	113,84±4,25	20	125,1±3,08	2,1453	<0,05
VIII ₂	18	103,5±2,05	30	119,2±3,16	4,1681	<0,001
IX	13	99,6±1,54	20	124,1±3,41	6,5479	<0,001
X	9	107,1±1,33	20	105,5±2,54	0,5580	>0,05
Total	53	106,01±2,03	106	119,2±1,26	5,5206	<0,001

În baza informației reflectate în tabelul 6 putem conchide, că pentru valoarea medie a organului (lungimea) la femei este diferență statistic semnificativă în grupurile VIII₁, IX și X – 85,8±2,11 mm, 112,0±5,01 mm; 122,2±2,12 mm, 105,4±3,42 mm; 109,1±2,08 mm, 101,4±2,74 mm (p<0,001; p<0,05).

Pentru grupul VIII₂ nu este diferență statistic semnificativă (113,9±2,14 mm și 113,0±3,12 mm), p>0,05.

Tabelul 6

Compararea rezultatelor lungimii splinei la femei după datele ecografice și morfometrice

Grupurile de vârstă	Femei, n=78		Femei, n=66		t	p
	Abs.	M±ES (mm)	Abs.	M±ES (mm)		
VIII ₁	8	85,8±2,11	9	112,0±5,01	4,8195	<0,001
VIII ₂	20	113,9±2,14	20	113,0±3,12	0,2389	>0,05
IX	20	122,2±2,12	20	105,4±3,42	4,1752	<0,001
X	20	109,1±2,08	17	101,4±2,74	2,2383	<0,05
Total	68	105,1±2,07	66	107,95±1,61	1,0868	>0,05

Datele referitoare la valorile medii prin compararea rezultatelor lățimii splinei la bărbați și femei sunt prezentate în tabelele 7, 8. Informația prezentată arată diferență statistic semnificativă în toate grupele de vârstă și în total (p<0,001).

Tabelul 7

Compararea rezultatelor lățimii splinei la bărbați după datele ecografice și morfometrice

Grupurile de vârstă	Bărbați, n=53		Bărbați, n=106		t	p
	Abs.	M±ES (mm)	Abs.	M±ES (mm)		
VIII ₁	13	42,0±1,05	20	78,1±2,07	15,5531	<0,001
VIII ₂	18	38,8±1,46	30	79,0±2,08	15,8189	<0,001
IX	13	35,2±2,01	20	84,5±2,19	16,5849	<0,001
X	9	39,3±2,47	20	71,4±2,14	9,8222	<0,001
Total	53	38,83±1,75	106	78,2±2,22	13,9273	<0,001

Tabelul 8

Compararea rezultatelor lățimii splinei la femei după datele ecografice și morfometrice

Grupurile de vârstă	Femei, n=78		Femei, n=66		t	p
	Abs.	M±ES (mm)	Abs.	M±ES (mm)		
VIII ₁	8	59,2±2,16	9	42,60±1,98	5,6652	<0,001
VIII ₂	20	79,1±2,17	20	42,85±1,08	14,9552	<0,001
IX	20	80,0±2,19	20	40,45±1,36	15,3418	<0,001
X	20	69,8±2,35	17	38,29±2,02	10,1683	<0,001
Total	68	69,9±2,15	66	41,05±1,61	10,7649	<0,001

Analizând rezultatele obținute, putem conchide, că diferența în funcție de apartenența de sex este statistic semnificativă pentru dimensiunile liniare (lungimea, lățimea) ale splinei, stabilite pe material cadaveric (în total) – p<0,001 și p<0,01 respectiv.

Diferența în funcție de apartenența de sex nu este statistic semnificativă pentru dimensiunile liniare – lungimea, lățimea, ale splinei umane după datele examinării ultrasonice (în total) p>0,05.

Compararea rezultatelor examinării ultrasonice și parametrilor morfometriici arată diferență statistic semnificativă p<0,001.

Bibliografie

1. Enculescu, C. Embriologie specială. Târgu Mureș, 2006.
2. Ionescu, G., Szabo, I. Splina. Cluj-Napoca, 1993, p. 16-43.
3. Suman, S. Aspecte morfofuncionale și semnificații clinice ale complexului coledocopancreaticoduodenal. Chișinău, 2014, 270 p.
4. Белоконев В.И., Терехин А.А. Особенности клиники, тактики и хирургического лечения повреждений органов левого поддиафрагмального пространства. Хирургия, 2006, 8, с. 38-42.
5. Демидов В.А. Травмы живота. Уральская Государственная медицинская академия. Кафедра хирургии ВУФ, www: urmedserv.Ru., 2001
6. Козлов И.З., Горшков С.З., Волков В.С. Повреждения живота. Москва, 1988, 224 с.