

## SATISFAȚIA GENERALĂ A PACIENȚILOR CU STENOZĂ AORTICĂ

Cristina Dodul

(Conducător științific: Snejana Vetrilă, dr. șt. med., prof. univ., Departamentul de medicină internă,  
Disciplina de cardiologie)

**Introducere.** Stenoza aortică este o condiție comună asociată cu morbiditate majoră, mortalitate și calitate scăzută a vieții. Este necesară reevaluarea fiziopatologiei de bază și a factorilor de risc, astfel încât să se poată dezvolta noi strategii terapeutice, pentru a analiza satisfacția generală a pacienților în vederea îmbunătățirii calității vieții.

**Scopul lucrării.** Evaluarea satisfacției generale la pacienții cu stenoză aortică cu scopul studierii caracteristicilor psihologice individuale ale adaptării pacienților cu stenoză aortică.

**Material și metode.** Am realizat un studiu transversal prospectiv care a inclus 24 de pacienți cu stenoză aortică. Pacienții au fost examinați conform chestionarelor: GWB (General Well-Being) și PQS III.

**Rezultate.** Vârsta medie a grupului de studiu a fost 53,6 ani. Conform chestionarului GWB 11 (45,8%) pacienți au „suferințe severe”, 11 (45,8%) pacienți au „stres moderat”, iar doar 2 (8,3%) pacienți se simt foarte bine. Conform chestionarului PQS III 14 (58,3%) pacienți au avut satisfacția generală mai mică decât media, 10 (41,6%) pacienți se plîngeau de calitatea tehnică scăzută, 16 (66,6%) pacienți aveau probleme interpersonale, 12 (50%) pacienți aveau probleme de comunicare, 12 (50%) pacienți aveau aspecte financiare nefavorabile, doar 5 (20,8%) pacienți se plîngeau de timpul scăzut petrecut împreună cu medicul, iar 13 (54,16%) pacienți aveau acces / disponibilitate / confort mai puțin decât media.

**Concluzii.** Conform chestionarului GWB, mai mult de 22 (91,6%) pacienți au avut un nivel moderat sau sever de stres. Rezultatele chestionarului PQS III sugerează că doar 10 (41,7%) pacienți au avut satisfacție generală mai mult decât media.

**Cuvinte cheie:** satisfacția generală, chestionar.

## GENERAL SATISFACTION IN PATIENTS WITH AORTIC STENOSIS

Cristina Dodul

(Scientific adviser: Snejana Vetrila, PhD, prof., Department of internal medicine, Discipline of cardiology)

**Introduction.** Aortic stenosis is a common condition associated with major morbidity, mortality and low quality of patient's life. It is necessary to re-evaluate the basic pathophysiology and risk factors so that new therapeutic strategies can be developed, to analyze the general satisfaction of patients to improve the quality of life.

**Objective of the study.** Evaluation of general satisfaction in patients with aortic stenosis in order to study the individual psychological characteristics of adaptation in patients with aortic stenosis.

**Material and methods.** We conducted a prospective transverse study that included 24 patients with Aortic Stenosis. The patients were examined according to questionnaires: GWB (General Well-Being) and PQS III.

**Results.** The average age of the study group was 53.6 years. According to GWB questionnaire 11 (45.8%) patients are “severe suffering”, 11(45.8%) patients have “moderate stress” and only 2 (8.3%) patients feel very good. According to PQS III questionnaire 14 (58.3%) patients had general satisfaction less than medium range, 10 (41,6%) patients were complaining about low technical quality, 16 (66,6%) patients had unsatisfied interpersonal issues, 12 (50%) patients had problems with communication, 12 (50%) patients had bad financial aspects, only 5 (20,8%) patients were complaining about time spent with the doctor and 13 (54,16%) patients had access / availability/comfort less than medium range.

**Conclusions.** According to GWB questionnaire more than 22 (91,6%) patients had moderate or severe stress level. The results of PQS III questionnaire suggest that only 10 (41,7%) patients had general satisfaction more than medium range.

**Key words:** general satisfaction, questionnaire.